

PATOS AGUJA

ANHINGIDAE

Se distinguen de los cormoranes por su cola más larga y ancha, cuello más largo y delgado y pico largo y agudo como de garza. Son hábiles pescadores subacuáticos y utilizan el pico como arpón para capturar peces. Entre inmersiones sacan del agua sólo la cabeza y el largo cuello, dando a veces la apariencia de una serpiente. Pasan largos ratos secándose al sol con las alas abiertas.

Pato Aguja (*Anhinga anhinga*). 90 cm. El macho es negro lustroso y exhibe grandes manchas plateadas en las alas. La hembra tiene las partes inferiores café claro. Cuando vuelan planeando en círculos sobre la Laguna ofrecen una silueta inconfundible por su cola larga y ancha, el cuello extendido, la cabeza pequeña y el pico largo y agudo. A veces reposan entremezclados con los cormoranes en grandes árboles y pasan fácilmente desapercibidos.

GARZAS

ARDEIDAE

A pesar de la variedad de tamaños y plumajes que hay dentro de esta familia, las garzas se distinguen fácilmente de otras aves por sus patas largas, cuello largo y flexible (generalmente retraído durante el vuelo) y pico largo, recto y agudo. La gran mayoría de las especies son propias de aguas quietas y de poca profundidad, donde vadean cautelosamente al acecho de sus presas. Se alimentan de peces y otros animales acuáticos.

Garzón Azul (*Ardea cocoi*). 120 cm. La mayor de las garzas de la Reserva. Cuello blanco, grisáceo en juveniles; coronilla negra con dos largas plumas que cuelgan sobre el cuello. Partes superiores azul grisáceo y abdomen negro; muslos blancos. Vuelo elegante de aleteo amplio y pausado, a veces con el cuello extendido. Generalmente solitaria pero anida en colonias en grandes árboles.

Garza Real (*Casmerodius albus*). 100 cm. Completamente blanca, con pico amarillo y patas negras. En el plumaje nupcial ostenta largas plumas en la espalda. Mucho más abundante que la especie anterior e igualmente colonial para el anidamiento, parece preferir aguas menos profundas.



1. Garza Real, 2. Garzón Azul, 3. Garceta Azul, 4. Garceta Patiamarilla.

Garceta Azul (*Florida caerulea*). 55 cm. Color general azul pizarra, el cuello marrón rojizo. Pico azul con el extremo negro. Los juveniles son completamente blancos o pueden presentar manchas azules; se distinguen de la Garceta Patiamarilla por el pico azul y negro y las patas verdosas. Solitaria.

Garceta Patiamarilla (*Egretta thula*). 55 cm. Completamente blanca. Pico y patas negras con dedos amarillos, además de su menor tamaño, la distinguen de la Garza Real, a la cual acompaña con frecuencia. El plumaje nupcial es aún más llamativo y abundante que en la Garza Real. Mucho más gregaria que las dos especies anteriores. Se encuentra generalmente en charcas de poca profundidad.

Guaco o Garza Nocturna (*Nycticorax nycticorax*). 65 cm. Una garza robusta, de cuello corto y grueso, alas grises, negra por encima y blanquecina debajo. Ojos rojos. Los juveniles son de color general café claro con estrías y puntos blancos en todo el cuerpo. Durante el día se refugian en árboles de follaje denso o permanecen estáticas en alguna percha baja. Al atardecer abandonan los dormideros y dejan oír los graznidos que le dan su nombre («guaac, guaac»)


Garza Tricolor (*Hydranassa tricolor*). 60 cm. En general color pizarra, con abdomen blanco y una lista blanca desde la barbilla a todo lo largo del cuello. Avanza por charcas someras dando grandes zancadas con las alas abiertas. Una especie propia de manglares, se registra con alguna frecuencia en la Laguna de Sonso.

Garza del Ganado (*Bubulcus ibis*). 50 cm. Toda blanca, con pico amarillo y patas verdosas o amarillas. En plumaje nupcial tiene plumas de color salmón en la coronilla, el pecho y la espalda. Se encuentra en terreno seco, acompañando al ganado o siguiendo a los arados en busca de insectos y otros pequeños animales. Oriunda de Africa, esta especie ha invadido todo el continente americano. Forma dormideros y colonias multitudinarias en árboles aislados.

Garcita Rayada (*Butorides striatus*). 40 cm. Llamada también «Cagamanteco». Grisácea, con coronilla negra, alas verdes y una lista blanquecina a lo largo del cuello con estrías marrón. Casi siempre posada en alguna percha a baja altura, encogida y muy quieta, hasta que extiende el cuello sorpresivamente para capturar alguna presa. Prefiere las orillas con mucha vegetación acuática. Al escapar deja oír un graznido muy característico.



1. Guaco o Garza Nocturna, 2. Garza Tricolor, 3. Garza del Ganado, 4. Garcita Rayada.



Avetorillo Bicolor (*Ixobrychus exilis*). 25 cm. La más pequeña de las garzas de Sonso. Negra por encima, blanquecina en las partes inferiores y café rojizo claro en los lados. Al volar muestra un extenso parche claro en las alas. Prefiere áreas de vegetación emergente muy densa. Ante cualquier perturbación extiende el cuello, dirige el pico hacia arriba y permanece muy quieta en esta postura, con lo cual se camufla con sus alrededores y pasa fácilmente desapercibida.


Avetoro (*Botaurus pinnatus*). 64 cm. En las partes superiores el color general es de pasto seco, con barrado negruzco muy fino. Partes inferiores blanquecinas con estrías café claro. Se encuentra generalmente en sitios de vegetación densa, pero ocasionalmente se ve en lugares más despejados. Se camufla mediante el mismo comportamiento de la especie anterior.

IBIS

THRESKIORNITHIDAE

La mayoría de los ibis son aves acuáticas. El cuello y las patas largas los asemejan a las garzas, pero su pico delgado y curvo, su apariencia algo más robusta y el hábito de volar con el cuello extendido, permiten diferenciarlos. Su coloración es por lo general oscura y lustrosa, con visos azules o morados. Se alimentan de insectos y otros pequeños invertebrados.

Coquito (*Phimosus infuscatus*). 50 cm. Negro lustroso con visos azul-verdosos. Piel de la cara, pico y patas, rojiza. Muy abundante en la Laguna, se ve en busca de alimento en potreros húmedos, charcas someras y orillas del río, o posado en los cercos. Anida en pequeñas colonias. El **Ibis Pico de Hoz** (*Plegadis falcinellus*) 55 cm, registrado ocasionalmente en la Laguna, se distingue del anterior por ser algo más robusto y por su color marrón muy lustroso y con visos bronceos. En plumaje reproductivo tiene un reborde blanco alrededor de la base del pico y de la piel facial desnuda.



1. Ibis Pico de Hoz, 2. Coquito, 3. Avetorillo Bicolor, 4. Avetoro.