

Cotorra Cheja (*Pionus menstruus*). 25 cm. Una lora más bien pequeña, toda verde excepto por cabeza y cuello azules, con una extensa mancha negruzca a los lados de la cabeza y las infracaudales rojas. Por lo general se encuentran en los chamburos y otros árboles grandes, en parejas o pequeñas bandadas hasta de 10 individuos.

CUCLILLOS, CUCOS Y GARRAPATEROS

CUCULIDAE

En general son aves de cuerpo delgado y cola larga y gradada, esto es, las timoneras son progresivamente más largas desde los lados hacia el centro de la cola. Tienen, al igual que las loras y carpinteros, patas zigodáctilas, aunque no son tan buenas trepadoras. Se alimentan de insectos y ocasionalmente de pequeños vertebrados.

Cuclillo Migratorio (*Coccyzus americanus*) (M). 30 cm. Café grisáceo por encima, incluida la cabeza hasta el nivel de los ojos, y algo rojizo en las alas. Partes inferiores blancas. Cola negra con grandes manchas blancas en el extremo de las timoneras. Mandíbula inferior amarilla. Es un migratorio de aparición más bien errática en la región entre septiembre y abril.

Cuclillo de Antifaz (*Coccyzus melacoryphus*). 25 cm. Se distingue del Cuclillo Migratorio por cabeza gris, extenso antifaz negro, pico negro y partes inferiores vicuña. Se encuentra generalmente en arbolados y rastrojos.


Cuclillo Rabicorto (*Coccyzus pumilus*). 20 cm. El más pequeño de su familia en la región. Partes superiores gris pardusco; garganta y pecho café rojizo en contraste con abdomen blanco. Cola negra, todas las timoneras con una mancha blanca en el extremo. Pico negro y ojos rojos. Busca insectos entre el follaje de árboles y arbustos.

Cuclillo Enano (*Piaya minuta*). 25 cm. Color general castaño rojizo, abdomen grisáceo. Pico amarillo y piel alrededor de los ojos roja. Cola larga con manchas blancas en el extremo de las timoneras. En rastrojos densos de madre viejas y orillas de la laguna.

Garrapatero Común (*Crotophaga ani*). 33 cm. Todo negro opaco, con aspecto escamado en pecho y espalda. Cola larga y pico arqueado. En potreros y matorrales, con frecuencia come junto al ganado. Muy gregario y ruidoso.



1. Periquito de Anteojos, 2. Cotorra Cheja, 3. Cuclillo Migratorio,
4. Cuclillo de Antifaz, 5. Cuclillo Rabicorto.



Garrapatero Mayor (*Crotophaga major*). 46 cm. Azul acero lustroso, cola muy larga. Ojos blancos. Pico negro, muy prominente debido al quiebre que presenta en la mandíbula superior. Se encuentra en bandadas de seis o más, en árboles y rastrojos cercanos a cuerpos de agua. Muy ruidoso, produce una gran variedad de vocalizaciones algunas de las cuales recuerdan el ruido de agua hirviendo.

Tres-piés (*Tapera naevia*). 29 cm. Por encima café claro con estrías más oscuras. Debajo blanco crema. Cola larga y cresta prominente, muy móvil. Generalmente emite su canto de dos notas («tres-piés») desde matorrales densos y bajos, pero a veces se expone mientras busca insectos en el suelo.

BUHOS

STRIGIDAE

Cabeza grande, ojos frontales grandes y prominentes rodeados por un amplio disco de plumas, pico ganchudo y fuertes garras con dos dedos hacia delante y dos hacia atrás, caracterizan a esta familia de rapaces nocturnas. Su plumaje suave los capacita para un vuelo en extremo silencioso. Son depredadores de insectos y pequeños vertebrados.

Currucutú Común (*Otus choliba*). 23 cm. Color general variable de grisáceo a pardo rojizo por encima, con una línea blanquecina en las escapulares. Partes inferiores crema con finas estrías negruzcas cruzadas por barras del mismo color. Disco facial blanquecino bien definido por línea negra. Ojos amarillos. Cuando está alerta muestra claramente las «orejas», un par de mechones de plumas que nada tiene que ver con el oído. A veces se encuentra durante el día descansando en sitios bien sombreados. Su voz («currucutú») se escucha desde el anochecer.



1. Garrapatero Común, 2. Garrapatero Mayor, 3. Cuclillo Enano, 4. Tres-piés.

