

Batará Mayor (*Taraba major*). 20 cm. Macho: partes superiores negras, con dos barras alares blancas; cresta prominente; partes inferiores blancas. Hembra: rufa por encima y blanca por debajo. Ojos rojos en ambos sexos. En rastrojos densos a la orilla de madrevejas.

Batará Carcajada (*Thamnophilus multistriatus*). 16 cm. El macho es finamente barrado («habado») de blanco y negro en todo el cuerpo. La hembra es de color castaño por encima, las partes inferiores barradas blanco y negro. En árboles de follaje denso. El canto es como una carcajada rápida y corta («jajajajá-jajajajá»).


Hormiguero Yegúá (*Cercomacra nigricans*). 15 cm. Macho: todo negro, excepto por tres barras alares y mancha blanca en el hombro, no siempre visible; cola gradada, timoneras con extremos blancos. Hembra: gris pizarra, con marcas alares como en el macho y garganta con finas estrías blancas. En rastrojos altos y densos. Constantemente emite su llamada «ye-guá, ye-guá...»

COTINGAS, CABEZONES

COTINGIDAE

Esta familia incluye algunas de las aves más espectaculares por su plumaje, su canto o su comportamiento, entre ellas el Paragüero (*Cephalopterus penduliger*), el Campanero Barbado (*Procnias averano*) y el Toropisco (*Pyroderus scutatus*), así como muchas otras de colores apagados y por lo demás inconspicuas. Son en general moradoras de selvas, aunque unas pocas son propias de hábitat abiertos con árboles dispersos. En sus dietas incluyen frutas e insectos.

Cabezón Cinéreo (*Pachyramphus rufus*). 13 cm. Macho: en general gris, con coronilla negro lustroso y frente blanca; partes inferiores y lados de la cara gris más claro. Hembra: canela, con la coronilla castaño y las partes inferiores blanquecinas con tinte canela. En cercos arbolados y rastrojos altos a la orilla de madrevejas y cursos de agua.



1. Cabezón Cinéreo, 2. Tiranuelo Matapalos, 3. Tiranuelo Silbador,
4. Tiranuelo Murino, 5. Tiranuelo Coronado.

