

**Golondrina Tijereta** (*Hirundo rustica*) (M). 15 cm. Por encima azul oscuro lustroso, por debajo canela intenso. Cola larga, ahorquillada y con manchas blancas en el extremo de las timoneras. Durante la muda del plumaje presenta aspecto desteñido y cola corta. Al final de su estadía en la región (Abril) suele congregarse en grandes números en alambrados y cables.

## **CUCARACHEROS Y AFINES**

---

### TROGLODYTIDAE

En su mayoría son insectívoros de bosques y rastrojos. Su aspecto general está dado por cabeza grande, pico fino y recto o ligeramente decurvado, patas fuertes, alas cortas y redondeadas y cola corta y erecta. El plumaje es sobrio pero en muchas especies está ornamentado con barras, puntos y estrías, por lo general en alas y cola. Sus cantos son notables.

**Cucarachero Común** (*Troglodytes aedon*). 11.5 cm. Todo café grisáceo con algunas barras negras en alas y cola. Cejas blanquecinas muy difusas. Pico más bien largo y agudo. Muy activo, anda a saltos en busca de alimento en el suelo, en grietas de troncos y hasta en los muros de las viviendas. Canto inconfundible, como una cascada de notas.


## **MIRLAS**

---

### TURDIDAE

En su plumaje opaco y proporciones generales, la siguiente especie representa bien las características de su familia. Sus dietas incluyen frutas e insectos en proporciones variables. Muchas especies buscan alimento en el suelo, bien sea en interior de bosque o en hábitat abiertos, en tanto que otras son estrictamente arbóreas. Sus cantos son complejos y melodiosos.

**Mirla Ollera** (*Turdus ignobilis*). 24 cm. Café grisáceo en general, un poco más claro por debajo y blanco en el abdomen. Pico negro. Anda a saltos por los prados en busca de insectos y lombrices y colecta barro en las charcas de lluvia para construir su nido.



1. Golondrina Azul y Blanca, 2. Golondrina Tijereta, 3. Golondrina Barranquera.

