

030

NUEVA ADICION A LAS RAPACES DE COLOMBIA

Por F. C. Lehmann V.

Micrastur plumbeus W. L. SelaterMicrastur plumbeus W. L. Selater, Bull. Brit. Orn. Cl., 38, 1918, p. 44.

(Carondelet, Río Bogotá, Province of Esmeraldas, Ecuador.)

Tres ejemplares de esta escasa variedad de Micrastur acaban de recibirse para la colección del Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca en Popayán. Todos provienen de la localidad "Guayana" en la hoya del Río Güiza, Diviso, Nariño, región cubierta de selvas.

Parece que esta es una de las especies de rapaces más escasas en las colecciones de los museos y fué descrita solamente en 1918. Como la coloración de los individuos del género Micrastur varía mucho de unos ejemplares a otros, creo de interés anotar a continuación las descripciones de nuestros ejemplares. Esta especie se diferencia de todas las otras del género por tener solamente una banda blanca a través de la cola, y en ocasiones una incompleta que queda cubierta por las coberteras supracaudales; además posee una cola muy corta para un Micrastur.

Mr. James Lee Peters dice que duda que esta variedad sea diferente de Micrastur ruficollis interstes, pero en mi opinión son enteramente diferentes.

Descripción de los ejemplares. - 1 ♂ ad. N°3654-L. de Guayana, Diviso, Nariño, Col. Sneidern, Abril 25, 1944. Por encima incluyendo la cabeza, lados de la cara, nuca, región escapular, espalda y rabadilla de color plomizo ceniciento con cierto lavado parduzco en las plumas viejas; alas por encima gris pizarrado con cierto tinte parduzco en las primarias; primarias y secundarias barriteadas de blanco en su lado interior; coberteras supra-caudales del mismo color que la rabadilla. Cola por encima negra pizarra atravesada hacia su parte media por una banda blanca de 6 milímetros de ancho; una banda incompleta de este mismo color y más angosta se encuentra hacia la base, pero está cubierta por las coberteras supra-caudales, la cola está terminada por un angosto margen blanco que falta casi completamente en las exteriores laterales. Por debajo blanco listado transversalmente y finamente con barras onduladas de color gris pizarra, más tupidas en el pecho que por esta razón parece gris pizarra listado de blanco, y más angostas y espaciadas hacia los flancos y el abdomen; bajo abdomen y coberteras subcaudales casi completamente blancos, estas últimas plumas con dos o tres barras incompletas. Barbilla y garganta del mismo

color de la cabeza y los lados de la cara. Cobertoras menores subalares blancas finamente barreteadas; las mayores así mismo finamente barreteadas, pero únicamente de la mitad hacia el extremo, las axilares menos densamente listadas; todas las barras de estas plumas del mismo color y tipo que las del pecho, flancos y abdomen. Primarias y secundarias de color gris café barreteadas por debajo de blanco del lado interior y con un ancho margen final de color pizarra cafeoso. Cola por debajo pizarra cafeoso atravesada por una banda blanca un poco más ancha que por el lado superior y con el mismo margen angosto final que por encima. Tibias blancas listadas con finas barras onduladas de color gris pizarra. Cara y piel desnuda de la cara en el ejemplar seco rojo naranja; maxila color café de cuerno en la parte superior, amarillenta en los lados hacia la base; mandíbula amarillo cromo; patas y tarsos amarillo naranja vivo; uñas café rojizo de cuerno; iris amarillo grisoso.

Dimensiones: Ala sin aplanar 175; cola 150; largo total 295; tarso 62; culmen sin cera 19 mm.

1 ♂ ad. N°3655-L, Col. Sneidern, abril 20, 1944, de la misma localidad. Este ejemplar está en plumaje más nuevo y parece más plumizo ceniciento que el anterior con la cabeza y la nuca más claras que la región escapular. La cola presenta una banda transversal más ancha, de 9 mm., y el margen final es también más ancho y visible. Difiere además por las plumas cobertoras subcaudales que son completamente blancas, y por las tibias que son menos densamente barreteadas. Este ejemplar no presenta la banda incompleta de la base de la cola que presenta el anterior, lo que me hace suponer que es un individuo bien adulto. Dimensiones: Ala 171; cola 142; largo total 295; tarso 60; culmen sin cera 18 mm. iris amarillo grisoso.

1 ♀ joven N°3656-L, Col. Sneidern, de la misma localidad. Difiere de los ejemplares anteriores en los siguientes caracteres: por encima gris pizarra más cafeoso que en los adultos, la región escapular, la nuca y la cabeza siempre más cenicientas que el resto. Cola negra pizarra con dos bandas blancas de 8 y 6 milímetros de ancho, siendo la posterior la más ancha; la cola está terminada por un margen blanco más ancho que en los ejemplares anteriores de 10 mm. Por debajo ~~más blanco~~ más blanco, llegando este color hasta la garganta y la barbilla, esta última presenta una mancha blanca muy conspicua y muy tenuemente tiznada de plumizo. Las barras de las partes inferiores son más finas y más espaciadas que en

los ejemplares adultos, por lo cual el pecho parece blanco listado de oscuro, y no como en el caso de los adultos. Las tibias son casi completamente blancas listadas con finas barras onduladas oscuras; las coberteras subcaudales son como en el caso anterior completamente blancas. En esto se asemejan estos dos últimos ejemplares a la descripción que de esta especie hace Mr. W. L. Selater de quien Swann en "Monograph of the Birds of Prey" Vol. I, 1925, p. 150 transcribe lo siguiente: "resembling in general colour M. gilvicolis from the Amazon basin, but very much greyer above, the crown and mantle bluish grey, becoming blacker on the rump and tail; below the transverse banding extends from the throat to the thighs, but not apparently to the under tail-coverts, and is composed of alternate bands of white and plumbeus rather than white and dusky; the throat and neck are unbanded plumbeus. The tail is very short compared with other species of the genus, and has only one cross-band of white about the middle of its length, though there are traces of another cross-band concealed by the coverts. In the other species of the genus there are always two, often three, such bands." Las dimensiones y coloración las da como sigue: "Iris light brown to yellowish grey, feet orange-red to yellow, bill blackish with a yellowish cere. Length about 330 mm., wing 178, tail 125, tarsus 64, In a female the wing is 167, the tail 120 mm."

Esta especie se conocía hasta el presente solamente de los ejemplares obtenidos en la parte nor-occidente del Ecuador en la provincia de Esmeraldas, así que nuestros ejemplares extienden el área de dispersión de esta especie hasta nuestra región sur-occidente en la vertiente del Pacífico del Departamento de Nariño. Mr. Selater dice: "There are in the British Museum two other examples from the same district, collected by Messrs. Millett and Fleming (who obtained the type). Another younger bird with only the breast transversely marked, in the Tring Museum, was obtained by the same collectors in the same region".

Es por consiguiente muy interesante poder añadir a nuestra ya larga lista de aves rapaces una especie más y aumentar así el número de ejemplares conocidos de esta rara variedad de Micrastur.

Las barras de nuestro ejemplar N°3656-L, ♀ joven, que venía describiendo arriba son de color pizarra parduzco en vez de pizarra plomizo, o pizarra negro como en los anteriores. La piel desnuda de la cara y la cera en el ejemplar seco no presentan la coloración viva de los adultos y aparece morena y opaca. La mandíbula solamente presenta coloración amarillenta de cuerno en la base y en el extremo.

y por la parte inferior. La maxila es de color de cuero café y presenta la coloración más clara de la punta. Dimensiones: Largo total 300; ala 175; cola 146; tarso 61; culmen sin cera 18 mm.; iris gris claro; en el ejemplar ~~se~~ la cera era amarillo verdosa.

Nota: No he podido obtener ningún dato referente a las costumbres y alimentación de esta especie. Por la localidad de donde procede y por ser un Micrastur es propia de regiones cubiertas de espesa selva y sus costumbres alimenticias semejantes a las de sus congéneres posiblemente a base de pequeños pájaros.