+ UNA RAPAZ DEL GENERO LEUCOPTERNIS NUEVA PARA LA CIENCIA -LEUCOPTERNIS XXWETMOREI

SEX NOV.

Por F. C. Lehmann V.

Leucopternis wetmorei sp. nueva.

Tipo un o adulto en la colección del Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca en Popayán, de El Diviso, Nariño, alt. Col. K. von Sneider, N°3654-L.
 Fecha 1944.

Diagnosis. - La más pequeña de todas las Leucopternis, se acerca en tamaño a L. semiplumbea, pero es aún menor. Difiere de todas las otras especies de este género en su coloración, que recuerda la de Micrastur r.interstes, pero es más ceniciento por encima y en especial la región escapular, la nuca y la cabeza son más claros, menos apizarrados, asemejándose en esto L. semiplumbea, pero por debajo es listada transversalmente de negro plumizo. La cola de los adultos presenta una banda transversal media de 5 a 9 mm. de ancho y un angosto margen final del mismo color que falta en las dos plumas laterales, ^{mm.} Longitud del ala 172-175; de la cola 143-153/ comparado con ala 190-208 y cola 195/de Leucopternis semiplumbea.

Distribución: Todos los ejemplares - 3 en total- provienen de la misma región en Nariño, Colombia, vertiente del Pacífico.

Descripción del tipo. - Por encima incluyendo la cabeza, lados de la cara, nuca, región escapular, espalda y rabadilla gris plumizo ceniciento con cierto lavado de rufo en las plumas más gastadas; alas por encima gris apizarrado con cierto tinte parduzco en las primarias, primarias y secundarias barreteadas de blanco en su lado interior, coberteras supra-caudales del mismo color que la rabadilla. Cola por encima negra pizarra atravezada hacia su parte media por una banda blanca de 6 milímetros de ancho, una banda incompleta de este mismo color y más angosta se encuentra hacia la base, pero está cubierta por las coberteras supra-caudales, la cola está terminada por un angostísimo margen blanco que falta en las dos rectrices laterales. Por debajo blanca listada transversal y finamente con barras de color gris pizarra, más tupidas en el pecho que por esta razón parece gris pizarra listado de blanco y más angostas y espaciadas hacia los flancos y el abdomen; bajo abdomen y coberteras subcaudales casi completamente blancos estas últimas plumas con dos o tres barras transversales irregulares; Barbilla y garganta del mismo color que la cabeza y los lados de la cara; coberteras menores subalares blancas finamente barreteadas, las medianas barreteadas solamente de la mitad hacia el extremo, y las mayores barreteadas menos intensamente que las menores, todas las barras del mismo color que las de los flancos, pecho y abdomen; primarias y secundarias por debajo barreteadas de blanco en su lado interior y con ancho margen final de

color pizarra cafésoso. Cola por debajo pizarra cafésoso atravezada en su parte media por una banda blanca un poco más ancha que por el lado superior y con el mismo margen angosto del lado superior. Tibias blancas listadas en la misma forma con finas barras onduladas de color gris pizarra. Cera y piel desnuda de la cara en el ejemplar seco ro-jo naranja; máxila color de cuerno en la parte superior, amarillento en la punta y en los lados hacia la base, mandíbula amarillo cromo; patas y tarsos amarillo naranja vivo; u-ñas cafésoso rojizo de cuerno. Iris

Dimensiones: ala sin apañar 173; cola 150; largo total 295; tarso 62; culmen sin cera 19 mm.

Observaciones: Esta especie de Leucopternis, recuerda la coloracion Macrastur r. in-
trestes, como ya lo anoté antes y también la de Accipiter superciliosus, por el tipo de listado de las partes inferiores, pero difiere de estos en su coloración más cenicienta por encima, menos apizarrada.

Otros ejemplares.- 1 o ad. ^{Nº 3655-h.} de la misma localidad. Está en plumaje mas nuevo y apare-
ce más plumizo ceniciento con menos lavado de rufo que el tipo y la nuca y la cabeza más
claras que la región escapular. La cola de este ejemplar presenta una banda transversal
mas ancha de 9 mm. de ancho y el margen final es así mismo más ancho y visible. Difiere
también del tipo por las plumas coberteras subcaudales que son completamente blancas y
por las tibias que son menos densamente barreteadas. Este ejemplar no presenta la banda
incompleta de la base de la cola que presenta el tipo. Dimensiones: ala 171; cola 142;
largo total 295; tarso 60; culmen sin cera 18 mm. ^{Nº 3656-h.} - 1 o joven de la misma localidad.
Difiere de los ejemplares anteriores en los siguientes caracteres: por encima pizarra
más cafésoso que en los adultos, la región escapular, la nuca y la cabeza siempre mas ce-
nicientas que el resto, Cola negra pizarra con dos bandas blancas de 8 y 6 mm. de ancho,
siendo la posterior la mas ancha y terminada la cola por un margen blanco más ancho que
en los dos ejemplares anteriores, que llega a 10 mm. Por debajo más blanca que ~~en~~ los
ejemplares anteriores, llegando este color hasta la garganta y la barbilla, esta última
parte presenta una mancha blanca muy conspicua y muy tenuemente tiznada de plumizo. Las
barras de las partes inferiores son mas finas y mas espaciadas que en los ejemplares an-
tes descritos, por lo cual el pecho parece blanco listado de oscuro y no como en el caso
de los otros ejemplares; las tibias son casi completamente blancas barreteadas por finas
lineas onduladas oscuras; las coberteras subcaudales son completamente blancas. Las barra-
ras de este ejemplar son de color pizarra parduzco en vez de pizarra negro o plumizo ne-
gro como los adultos. La piel desnuda de la cara y la cera en el ejemplar seco no presen-
ta la coloración viva de los adultos y a parece opaca y morena. La mandíbula solamente

presenta coloracion amarillenta de cuerno en la base y en el extremo y por la parte inferior; la máxila es oscura de color de cuerno café y presenta la coloración amarillenta de cuerno hacia la punta, ~~para ser de color café hacia la punta~~ Dimensiones: ala 175; cola 146; largo total 300; tarso 61; culmen sin cera 18 mm.

Nota: No he podido obtener hasta el momento ningún dato referente a las costumbres, hábitat y hábitos alimenticios de esta nueva especie. Los caracteres que distinguen estos ejemplares son a mi modo de ver específicos y por lo tanto ^{he} le/dado un nuevo nombre, dedicándola al Dr. Alexander Wetmore, Secretario General de la Institución Smithsonian de Washington, en testimonio de mi admiración y amistad muy sinceras.

F. Carlos Lehmann V.