

NOTAS SOBRE ALGUNAS RARAS ACCIPITRIDAS Y FALCONIDAS DE COLOMBIA.

F. C. Lehmann V.

Aunque las especies a que me refiero en este trabajo fueran ya mencionadas por el Dr. A. Dugand en su "Clave Analítica de las Rapaces Colombianas" (Rev. Acad. Colomb. Cienc. IV, 16; 394-404. 1941) creo de interés hacer conocer los detalles de los ejemplares que he examinado, muchos de los cuales son los únicos que hasta ahora han sido obtenidos en Colombia.

Buteo poecilochrous Gurney.Buteo poecilochrous Gurney, Ibis, (1879) p. 176 (Yauyacu, Ecuador)

Solamente dos ejemplares pertenecientes a esta especie han sido obtenidos en Colombia. Ambos en la hoya del Río Patía, Depto. del Cauca, al sur de Popayán, vertiente del Pacífico. El primer ejemplar (♂ adulto) logré cazarlo en el Municipio de El Bordo en agosto de 1936, alt. 900 mts. El segundo lo obtuvo Von Sneider en el Municipio de El Tambo, en las cabeceras del Río Patía, alt. 2000 mts., en 1938. Este último es una ♀ adulta que presenta una curiosa mancha blanca hacia el centro de las plumas en tres de las secundarias de cada ala. Queda así ampliada hasta nuestro país el área de dispersión de esta especie que solamente había sido obtenida desde el Ecuador hacia el sur. La hembra obtenida en el mes de abril tenía un huevo a punto de poner.

Buteo polyosoma polyosoma (Quoy & Gaimard)

Falco polyosoma Quoy & Gaimard, Voy. Uranie, Zool., pt. 1 (1824) 92, pl. 14 (Islas Falkland).

Yo he obtenido tres ejemplares de este Buteo, 1 ♂ y 2 ♀, todos adultos, en la región de Quintana, vertiente occidental de la Cordillera Central, al oriente de Popayán, en 1936 y 1937. Dos de estos ejemplares (♂, ♀) pertenecen al Museo de la Universidad del Cauca, en Popayán. Los tres ejemplares, de los cuales 1 ♀ conservé por algún tiempo viva, tienen todos la coloración normal de los adultos, dato curioso debido a la gran variedad de coloración que suele presentar esta águila. El Instituto de Ciencias Naturales posee un ejemplar ♂ joven, col. Sneider en El Tambo, Cauca, alt. 1790 m., Oct. 1941. Otros tres ejemplares col. Sneider fueron despachados al exterior. En abril de 1936 el Sr. Von Sneider envió uno de El Tambo al Real Museo de Historia Natural de Estocolmo, Suecia, donde fué identificado como Buteo.

polyosoma unicolor Lafr. & d'Orb., pero esta denominación aceptada por el Dr. Struhschmann para una raza localizada en la parte norte de los Andes no es aceptada hoy. Los otros dos ejemplares de esta especie y de la misma localidad enviados en febrero de 1937 al Field Museum de Chicago por Von Sneidern, fueron determinados allá como B. p. polyosoma.

Al referir los cuatro ejemplares examinados por mí a la raza típica y no a Buteo polyosoma peruviansis Swann, sigo el criterio del Dr. Chapman, quien en su libro "Distribution of Bird-Life in Ecuador" (Bull. Am. Mus. Nat. Hist. 56, p. 227, 1926) y de J. L. Peters (Check-List Bds. World, I, p. 229, 1951).

El Dr. Chapman l.c. señala un área de dispersión muy extensa a la raza típica: "Zona templada. La especie Tierra del Fuego hasta Colombia; la raza, igual excepto la costa del Perú y del Ecuador" y cita un ejemplar ♂ de Santa Isabel, Cordillera Central, Colombia, alt. más de 3000 m. Peters l.c. le señala la siguiente área de dispersión: "Andes del Ecuador y el Perú hacia el sur, a través de Bolivia, Chile y Argentina, hasta Tierra del Fuego y las Islas Falkland"; restringiendo, lo mismo que Chapman, la raza peruviansis a la costa del Ecuador y el Perú. En cambio Swann (Monogr. Bds. Prey, I, p. 409) señala para la raza típica un área de dispersión más austral, ampliando el área de peruviansis hacia el norte: "Noroeste del Perú - al occidente de los Andes-; el Ecuador y los Andes del Quindío en Colombia".

Las dimensiones del único ejemplar del Instituto de Ciencias Naturales coinciden con las de la raza típica, la cual es un poco más grande que peruviansis, y su fórmula alar no deja lugar a duda en su identificación:

♂ joven: Ala 425; cola 210; culmen (sin cera) 30; tarso 89; largo total 510 mm.

Me atrevo a creer que esta especie no sea residente en Colombia, sino visitante durante el invierno de las zonas australes, pues todos los ejemplares que yo he visto, han sido obtenidos entre abril y octubre, y además, es muy escasa. Parece que se alimenta de aves, Columba albilinea albilinea ha sido encontrada en el buche.

Leucopternis albigollis costaricensis (W.L.Sclater) ?

Leucopternis ghiesbreghtii costaricensis W.L.Sclater, Bull. Brit. Orn.

Cl., 39 (1919) p. 76, (Carrillo, Costa Rica).

Ejemplares examinados: 1 ♂ joven, Guaicaramo, Boyacá, Julio 1930 (Mus. Inst. La Salle). Ala 360; Cola 210 - por estar muy gastado el margen blanco final; Tarso 85; Culmen (sin cera) 32; Largo total 515 mm. - 1 ♂ adulta, Río Juradó, Chocó, col. Sneidern, Feb. 1940. Ala 350; Cola 240; Tarso 85; Culmen (sin cera) 30; Largo total 533 mm.

Me referiré únicamente al ejemplar joven de Guaicaramo, pues el del Chocó no deja lugar a duda sobre su identidad. Las características de coloración del citado ejemplar son semejantes a las de los ejemplares jóvenes de Leucotis albigollis costaricensis, y sus dimensiones son también muy semejantes a las de esta raza, como se puede ver arriba. De confirmarse esta identificación extenderíase el área de ~~dispersión~~ dispersión de costaricensis mucho más hacia el Oriente, ya que hasta ahora solamente ha sido señalada hasta el Chocó en la frontera panameña (cf. Dugand in Caldasia I, 3: 56. 1941) y la localidad de Guaicaramo está situada en la base oriental de la Cordillera Oriental, Departamento de Boyacá, cerca de los Llanos. El ejemplar de Guaicaramo difiere claramente de la raza típica albigollis de Venezuela, las Guayanas y la Amazonia, por tener la cola blanca con una franja subterminal negra, mientras que albigollis típica - de la cual tenemos ejemplares de ~~Florencia~~ Florencia, Caquetá, - la cola es negra en su mayor parte. Florencia también está situada en la base oriental de la Cordillera Oriental, pero dista unos 450 kilómetros al suroeste de Guaicaramo. Por lo tanto es posible que en la región intermedia, o sea en la parte subandina de la Intendencia del Meta, las dos razas se entremezclen, pero no tenemos ejemplares de esta región para confirmar la hipótesis.

Urubitornis solitaria (Tschudi).

Circus solitarius Tschudi, Arch. f. Naturg. 1844, p. 264. (Chanchamayo, Perú).

Ejemplar examinado: 1 ♂ adulta, Munchique, Tambo, Cauca, col. Sneidern. Este ejemplar difiere de las descripciones dadas para esta águila en que no tiene ni siquiera rastros de coloración achocolatada, por lo cual creo que

se trata de un individuo completamente adulto. Por esta razón creo de interés dar la descripción de este ejemplar perteneciente al Museo del Colegio de Santa Librada, Cali.

Coloración general gris-plomo; tibias gris-pizarra; líneas centrales negras en todas las plumas, más visibles en el lado inferior. Cabeza, cuello, región escapular y hombros gris-plomo. Superficie inferior de las alas gris-plateado; primarias y secundarias listadas transversalmente con 6 a 8 líneas angostas irregulares negruzcas y terminadas en un ancho margen negro, más extenso en las primarias. Las cinco primeras rémiges recortadas en su lado interior. Cola Negra, atravesada por una ancha banda blanca hacia el medio; y con una banda más angosta y no completa más hacia la base y también una casi imperceptible más adentro, y solamente visible de debajo, además está terminada por un angosto margen blanco. Coberteras superiores de la cola negras marginadas de blanco. Coberteras subcaudales negro-pizarra marginadas y listadas de blanco. Coberteras subalares gris-plomo con un ligero tinte rojizo. Coberteras supraalares más oscuras. Iris: café-rojizo. Cera y patas amarillas.

Spizastur melanoleucus (Vieillot)

Buteo melanoleucus Vieillot, Nouv. Dict. d'Hist. Nat. 4 (1816) p.482
(Guayana).

Muy pocos ejemplares han sido obtenidos hasta el presente en Colombia, de esta especie, una de las más bellas águila que existen en América.

Ejemplares examinados: 1 ♂ adulto y 1 ♀ adulta, ambos de Villavicencio, Intendencia del Meta, col. Hno. Nicéforo (Mus. Inst. La Salle, Bogotá).

Ala ♂ 360, ♀ 404; cola ♂ 230, ♀ 253; tarso ♂ 70, ♀ 81; culmen (sin cera) ♂ 28,5, ♀ 33; largo total ♂ 501, ♀ 630 mm.

El Sr. M. A. Carriker Jr. obtuvo también dos ejemplares, 1 ♂ en Monte Elías, Sierra de Perijá, alt. 1500 m., en 1941, y 1 ♀ en Casacará, en 1942. Ambas localidades están situadas en la parte oriental del Departamento del Magdalena, cerca de la frontera venezolana. En Agosto de 1942 yo recibí las patas de un macho matado en la vereda de Villa-Gómez, Río Mezipá, Cundinamarca, alt. 1700 m. En abril de 1942 observamos con el Sr. J. I. Borrero, auxi-

liar de la Sección de Ornitología del Instituto de Ciencias Naturales, un ejemplar que estaba parado en un árbol seco, sobre el filo de una serranía en la Región de Moscopán, Cauca, pero no logramos matarlo. Esta localidad está en la Cordillera Central, vertiente oriental y a una altura de 2900 m. sobre el nivel del mar. Uno de los ejemplares de Villavicencio tenía en el estómago un pájaro.

Falco deiroleucus Temmink

Falco deiroleucus Temmink, Pl. Col., livr. 59 (1825) pl. 348 (Isla São Francisco, Santa Catharina, Brasil).

El Museo del Instituto de La Salle en Bogotá, posee dos ejemplares de esta rara especie de halcón: 1 ♀ joven de Purificación, Tolima, y 1 ♂ adulto de Guáicaramo, Boyacá. M. A. Carriker Jr. obtuvo una ♀ en La Esperanza, Magdalena, en 1942, y K. von Sneidern consiguió un ♂ adulto en Moscopán, Cauca, en febrero de 1943.

J. Carlos Lehmann