

EL GÉNERO MORPHNUS

0316

Por F. G. Lehmann V. A. A. O. U.
Jefe de Ornitología del Instituto.

Género MORPHNUS Dumont.

MORPHNUS GUIANENSIS (Daudin).

AGUILA CHURUQUERA

Otros nombres: Aguila miquera; Gavilán Miquero; Aguila copetona;
Aguila-gavilán; Gavilán Real.

Falco guianensis Daudin, Traité, T.II, p. 78, 1800. (Cayenne).

Falco sonnihi Shaw, Gen. Zool., VII, p. 67, 1809.

Morphnus guianensis Cuv., Regne An., T.I, p. 318, 1817; Schomburgk,

Reisen in Britisch-Guiana, T.III, p. 738, 1848; Burmeister, Die

Thiere Brasiliens, T.II, p. 66, 1856; Pelzeln, Orn. Bras., pp. 4,

397, 1871.

Morphnus cristatus Less., Traité, T.II, p. 51, fig. 2, 1831.

Thrasaëtus guianensis Kaup, Mus. Senckemb., III, p. 260, 1845.

Morphnus taeniatus Gurney, Ibis, p. 176, pl. iii, 1879.

Morphnus taeniatus Chapman, Bull. Am. Mus. Nat. Hist. vol. IV, 1926;

Swann, Monogr. Bds. Prey, vol. I, pt. viii, p. 481, 1930.

Morphnus guianensis Swann, Id. p. 479, 1930.

Distribución: En Colombia se encuentra en las regiones tropicales húmedas; Llanos Orientales, Chocó, Valle del Magdalena (parte cubierta de selvas), sur de la Guajira, Caquetá y Amazonia. Se le señala como área de dispersión: Honduras, Panamá, Colombia, Venezuela, Guayanas, el Oriente del Brasil, el Oriente del Perú, hasta el Paraguay.

Caracteres: ♂ inmaturo. Localidad Belén, Caquetá. Altura 155 metros sobre el mar. Obtenido por Kjell von Sneidern. N° 564 original KVS.

Iris: Gris-plateado oscuro; pico y cera negros; patas amarillo blanquecino sucio. Largo total 760 mm.; Ala 440 mm.; Coda 405 mm.; pluma mas larga del copete 107 mm.; Tarse 105 mm.; Culmen sin cera 40 mm.;

Cabeza blanca con la parte superior teñida en el extremo de las plumas de un color herrumbre-pardusco claro, la base de las plumas completamente blanca. frente con un tinte ocráceo o blanquecino amarillento. Región auricular mas blanca, lo mismo las mejillas y los lados de la

84

cara, garganta y barba blancas; todas las partes inferiores completamente blancas, incluyendo las coberteras subcaudales, las coberteras subalares y las tibias y los flancos. Partes superiores de un color gris amarillento más o menos marmoreadas y salpicadas de café obscuro y negro-rojizo en las plumas más viejas y fondo gris-plateado y manchas negras en las plumas más nuevas. Coberteras alares más claras que el resto de la espalda, algunas de las coberteras más grandes con unas manchas grandes de color obscuro. Parte inferior de la nuca más oscura, con las plumas marginadas de gris-plateado u ocráceo. Plumas del opete blancas con una ancha mancha negra cerca al extremo y una angosta punta blanca. Rémiges primarias y secundarias por encima negro-café o negro-rojizo con bandas angostas veteadas de gris-plateado en las plumas nuevas y gris-rojizo en las plumas más viejas. Espalda y rabadilla marmoreadas o veteadas de gris-rojizo y café, la última parte con las plumas de los lados blancas. Cola por encima listada ~~listada~~ irregularmente en forma de V sobre todo en las plumas centrales, con negro-café y gris-rojizo, estas últimas bandas las más anchas y veteadas o salpicadas de café-negro. En total ocho bandas oscuras visibles. Coberteras caudales superiores ~~iguales~~ de igual coloración que las coberteras alares. Cola por debajo más clara que por el lado superior, siendo las bandas claras el doble de ancho que las oscuras y de un color blanco sucio o ceniciento sucio.

Como se puede ver este ejemplar es muy semejante al ejemplar prematuro de Honduras citado por Swann en su Monografía de las Aves Rapaces volumen I, página 480, 1930. Solamente que él da una longitud de ala mayor, 450 mm.

La localidad de Belén donde fué obtenido este ejemplar está situada en la región sur-este del país muy semejante en condiciones naturales a la localidad típica de Morphnus taeniatus y no muy distante o aislada por condiciones topográficas. Tanto el ejemplar que dejo descrito como otro de la misma localidad en el mismo plumaje son verdaderos guianensis sin lugar a duda. Por esto y por las descripciones de los siguientes ejemplares podrá verse que mi opinión de que solamente hay una especie de Morphnus tiene bastante fundamento.

Caractéres: ♀ joven. Localidad Río Juradó, Vertiente del Pacífico Chocó. Altura 100 metros. Col. K. v. Sneidern Octubre 22. 1940. N° 3422Z.

Iris: Gris-castaño claro; pico: negro de cuerno; cera y piel de la cara: pizarra-negro; patas: amarillas. Largo total: 830; ala: 490; cola: 420; culmen sin cera: 44,5; tarso: 117 mm.

Cabeza gris-rojiza, más clara hacia la frente que tiene un tinte ocráceo amarillento, y más oscura hacia la corona y el opete; algunas de las plumas de esta región fina y suavemente salpicadas de negro-café. Lados de la cara y región auricular gris-rojizo con cierto tinte ocráceo amarillento como fondo; todas las plumas de estas partes terminadas en un angosto margen ocráceo-pálido o anteado-amarillento. Barba y garganta blancas con un tinte amarillento sucio. Nuca, parte superior de la región interescapular, lados del cuello, lados del pecho y parte superior de éste, de un color gris-rojizo finamente salpicado de café. Región interescapular y escapular de color negro intenso brillante, las plumas marginadas en el extremo de ocráceo amarillento o gris salpicado de café. Filo del ala en los hombros blanco. Pequeñas y grandes coberteras alares de color gris-rojizo salpicadas de café y manchadas algunas con negro-café o negro; todas con un margen muy notorio más claro blanco sucio o grisoso. Secundarias de un fondo gris-rojizo salpicadas de negro-café y listadas transversalmente por 5 a 7 bandas irregulares de color negro-café. Primarias semejantes, pero más oscuras y bandadas en la misma forma. Coberteras subalares blancas. Pecho y abdomen blancos; el primero muy tiznado en la parte superior de gris-rojizo o café-negruzco, que vá disminuyendo hacia abajo; algunas de las plumas de la parte media entre el pecho y el abdomen muestran algunas manchas anchas transversales de color negro-café, dispuestas en la misma forma que en el ejemplar totalmente listado que veremos más adelante, lo que puede ser indicio del comienzo de esa coloración. Algunas de las plumas del vientre presentan así mismo rastros de listas transversales oscuras muy cerca de la punta. Los flancos y las tibias son blancos, pero notablemente salpicados de café-rojizo un poco gris. Rabadilla gris-rojiza salpicada de café-rojizo. Coberteras superiores de la cola laterales igual que la rabadilla y las más centrales negro-café oscuro con ancho margen blanco y salpicadas del

vesada por seis bandas visibles de color negro-café muy irregulares y terminada en un angosto margen blanco-amarillento. Por debajo más clara que por encima y con el margen final más ancho. Coberteras subcaudales completamente blancas.

♂ adulto. Río Juradó, Vertiente del Pacífico, Chocó. Altura 100 mts. Col. K. v. Sneider. Septiembre 4 de 1940. Nº 3420-L.

Carácterés:- Largo total: 775; Ala: 434; Cola: 375; Culmen sin cera: 40; Tarso: 105 mm.

Iris: 14 mm. pardo-amarillento grisáceo. Cera y piel pizarra-negrusco. Patas: amarillas; Pico negro de cuerno.

Cabeza gris-rojiza, más clara en la frente donde está muy salpicada de ocráceo. Plumas del copete, no totalmente desarrolladas con una mancha grande de color negro-café oscuro y con un ancho margen de color gris-rojizo. Nuca, región interescapular y escapulares de color uniforme negro intenso brillante. Una ceja de color pizarra se extiende hacia la región auricular por encima; lados de la cara blanco-amarillento; lados del cuello gris-ceniciento, todas las plumas marginadas con blanco sucio; barba y parte de la garganta blanco amarillento; garganta y parte superior del pecho de color gris-rojizo, todas las plumas con un angosto margen ocráceo-amarillento. El resto de las partes inferiores incluyendo el pecho, abdomen, flancos, tibias y coberteras subcaudales de un fondo blanco o ligeramente anteado con líneas angostas transversales de color rojizo-herrumbre, menos fuertes y más espaciadas en el bajo vientre y en las coberteras subcaudales; más intensas en el pecho y las tibias. Pequeñas coberteras alares negras o negro-café con un margen muy notorio de color blanco que hace ver esta parte del ala muy pintada o como listada irregularmente. Coberteras medianas y mayores listadas transversalmente con bandas anchas de color gris-rojizo moteado o salpicado de café y bandas anchas negras; todas estas plumas con un ancho margen final blanquecino o gris muy claro y salpicado finamente de café. Las secundarias marginadas al extremo con gris-rojizo, lo mismo las primarias, pero en éstas menos notorio. Coberteras subalares blancas. Rabadilla y coberteras superiores de la cola negras y anchamente marginadas de blanco. Cola ne-

grá atravesada por tres bandas anchas de color gris ceniza salpicado de café, con un angosto margen final por el lado superior de color blanco y gris. Por debajo toda la cola es más clara, las bandas claras son de un tono gris-plateado y el margen final más ancho.

♂ adulto. Río Salagui, Vertiente del Atrato, Chocó. Altura 300 mts. Col. K. v. Sneider. Noviembre 3. 1940. N° 3423 - L.

Caractéres: Largo total: 750; Ala: 440; Cola: 375; Copete: 83; Tarso: 108; Culmen sin cera: 39 mm.

Iris: 15 mm. Gris obscuro; Cera: pizarra-negra; Patas: amarillas; Uñas negras. Dedo interior con la uña 73 mm., uña posterior 50 mm.

Color general por encima negro-café brillante, más intenso en la región interescapular. Pequeñas coberteras alares marginadas o terminadas en una angosta línea blanca o anteada o ligeramente ocrácea, principalmente sobre el lado interior de las plumas. Grandes coberteras alares marginadas de blanco o anteado-crema y listadas transversalmente por bandas claras punteadas no visibles. Rémiges de color negro-café, listadas con cuatro bandas anchas de color pardo-gris moteadas de negro; lo mismo las secundarias, pero en éstas más angostas las bandas claras. Escapulares negro-café con la base blanca o moteada con café, además unas escasas líneas blancas que están tapadas. Nuca, negruzca-acefetada, los del cuello gris-café, las plumas marginadas de ante u ocráceo, todas las plumas con una línea central más oscura. Plumas del copete, blancas en la base, grises en el centro, y casi negras o negro-café hacia la punta, bordeadas o marginadas de gris-blancuecino o amarillento. Corona o parte superior de la cabeza gris-ceniciento o aplomado, se alcanza a notar un tenue margen en las plumas de esta parte del mismo color que el de las plumas del cuello. Frente gris con un notable tinte anteado-crema u ocráceo. Región auricular gris plomo. Barba y garganta blanco-amarillento u ocráceo claro; un pequeño lunar gris en el centro de la barba. Parte superior del pecho gris-café notablemente salpicada de ocráceo; el centro de las plumas más obscuro. Pecho central un poco más obscuro, café, pero con el centro de las plumas siempre más obscuro o negruzco. Parte inferior del pecho, parte superior del abdomen y flancos densamente listados transversalmente de negro-café y blanco por bandas.

de un mismo ancho; el blanco con ligero tinte amarillento o sucio en algunas plumas. Parte superior del vientre también listada con los mismos colores, aunque en menor densidad y solamente hacia el extremo de las plumas cuya base es blanca. Tibias tupidamente listadas de negro-café y blanco. Coverterras subalares blancas, todas listadas muy fuertemente de negro-café, las más grandes solo hacia el extremo. Espalda y rabadilla negras; las plumas de esta última parte marginadas de blanco. Coverterras caudales superiores blancas en la base, negras en el resto, y listadas transversalmente en su primera mitad de blanco y marginadas del mismo color. Cola por encima negra, listada transversalmente por tres bandas anchas de color gris-rojizo o gris-ocráceo, salpicadas profusamente de café o negrozco; terminada en un angosto margen blanquecino. Por debajo listada transversalmente por bandas de un mismo ancho negras y blanco-ceniciento o blanco-platado, el margen final más blanco que por el lado superior. Coverterras subcaudales blancas y notablemente listadas en sentido transversal de negro-café. Región desnuda de piel entre el ojo y la cera de color pizarra-negro y sembrada de cerditas. Mr. H. Kirke Swann en su obra ya citada Monograph of the Birds of Prey, Volumen I, parte viii, página 481, 1930 dá a entender que la validéz de M. taeniatus no es muy digna de tenerse en cuenta y que posiblemente no sea más que una fase de M. guianensis. El hecho de que solamente se haya encontrado esta fase de coloración en la parte Oriental del Ecuador, es quizá lo que ha hecho pensar en una raza local y como tal ha sido tenida hasta el presente, pero ahora con la presencia de esta misma o muy semejante forma de coloración en una región como el Valle del Río Atrato, en el noroeste de Colombia, región completamente aislada de la localidad típica de M. taeniatus, por la Cordillera de los Andes, hace pensar que la forma taeniatus no es otra cosa que una variación de coloración de M. guianensis. Los cinco ejemplares que existen en la colección del Instituto de Ciencias Naturales que estoy describiendo, son todos diferentes como ya lo escribió el Dr. A. Dugand en el Boletín del Instituto "Caldas" N°3, p.57, Dic. 1941, y como puede verse por

estas descripciones más detalladas de los mismos ejemplares. El Dr. Dugand también consideró que el plumaje rayado de nuestros ejemplares no es otra cosa que una fase más de coloración.

La similitud entre este ejemplar y la descripción de Morphnus taeniatus dada por Swann l. c., puede verse a continuación por la transcripción de dicha descripción: "Ala ♂ (?) 445; ♀ (8) 461, cola 395, culmen sin cera 40; tarsó 104, copete (pluma más larga) 115 mm. Corona y lados de la cabeza pizarra obscuro; por encima café-negruzco; coberteras alares notablemente listadas con blanco; cola café-negruzco con cuatro bandas blancas, moteadas y salpicadas con gris-pardusco; garganta y parte superior del pecho negruzcas; por debajo, incluyendo las coberteras subalares, listada por bandas anchas y tupidas de blanco y negro".

Ejemplar melánico. - ♂ adulto. Río Juradó, Vertiente del Pacífico, Chocó. Altura 100 mts. Col. K. v. Sneider, Septiembre 24. 1940
Nº 3421 - I.

Caracteres: Largo total 820; Ala: 453; Cola: 375; Culmen sin cera: 38,5; Tarsos: 106 mm.

Iris: 15 mm. castaño claro; Cera y piel: pizarra-negruzco; Pico: negro de cuerno; Patas: amarillas.

Cabeza, lados de la cabeza y cara, y la garganta de un color pizarra-plómizo con cierto tinte rojizo, más intenso sobre las últimas partes. Las plumas más largas del copete con la base blanca y el resto negro intenso. Pecho, región escapular, espalda y coberteras alares de un color negro-café intenso con cierto brillo metálico. Todas las partes inferiores oscuras, incluyendo el pecho, los flancos y las tibias de un tono café obscuro, solamente interrumpido por el margen de algunas plumas que es ligeramente más claro con un tinte ocráceo. Las tinias notablemente manchadas de gris-rojizo y finamente salpicadas de blanco en su lado interior. El vientre es un poco más claro que el resto de las partes inferiores con cierto tinte café-rojizo; las plumas de esta parte que son blancas en la mitad de su longitud, están listadas transversalmente con anchas bandas negruzcas como en el ejemplar anterior, pero estas han-

das solamente se ven levantando las plumas, que en posición normal parecen de un color uniforme obscuro. Las alas cerradas, por encima, se ven de un color negro-café uniforme, sin márgenes claros en ninguna pluma. Las primarias son de color negro-café atravezadas por tres bandas muy anchas de color gris-rojizo marmoreado con café; las secundarias son listadas en la misma forma por tres bandas más claras que van decreciendo de las primeras hacia las últimas. Las alas por debajo presentan un aspecto muy claro y completamente listado de blanco-plateado y negro; coberteras interiores de las alas más pequeñas negras, las más grandes blancas en la base y manchadas hacia el extremo por bandas anchas no muy definidas de color café obscuro. Rabadilla y coberteras superiores de la cola negras, las últimas con un angosto margen, casi imperceptible, blanquecino. Cola por el lado superior negra, listada transversalmente por cuatro bandas de color gris-plateado y salpicadas de café, que varían desde unas manchas incompletas en la primera de la base y aumentando en anchura y regularidad mientras más se acercan al final de la cola, donde está ésta terminada por un angostísimo margen blanquecino. Cola por debajo negra, con las bandas claras más regulares que por el lado superior. Coberteras subcaudales notablemente listadas con bandas transversales anchas de color negro y blanco, casi del mismo ancho, aunque en algunas predomina el negro. Todas las plumas tienen la base blanca.

Esta fase de coloración no ha sido descrita hasta ahora para esta especie de águila, y representa sin duda un caso de melanismo. Por las características de la cola, parece que es un ejemplar adulto.

- - - - -

El águila churuquera es una de las variedades de águila menos conocida en el país. Por sus costumbres selvícolas y por encontrarse exclusivamente en las regiones más cálidas y húmedas, cubiertas de selvas casi impenetrables, y todo esto, unido a que es un ave en extremo arisca, hacen de ella una especie rara aún en las colecciones de los grandes museos de los Estados Unidos y de Europa.

91

pa. No quiere esto decir que tales museos no posean ejemplares, sino que, no tienen grandes series como sucede con otras especies. De esto resulta que solamente se han descrito el plumaje del joven y el plumaje normal o más general del adulto para la especie guianensis, y los ejemplares rayados, hasta ahora solamente encontrados en el oriente del Ecuador han sido descritos como una especie diferente bajo la designación de taeniatus. Ya Swann como lo he anotado más arriba en su obra de las Rapaces del Mundo, muestra su incertidumbre sobre la validez de esta especie, aunque dice que las diferencias de coloración son tan grandes que parecen ser específicas.

Hasta ahora las mejores descripciones sobre el aspecto y costumbres de esta bella águila en estado libre, nos han sido legadas por el Príncipe de Wied, Burmeister, Schomburgk, y Tschudi. Todos estos autores citan en sus observaciones ejemplares encontrados en el Brasil, la Guayana y el oriente del Perú. Hasta hoy no se ha escrito nada sobre la presencia y costumbres de esta águila en Colombia. El Dr. Frank M. Chapman en su interesantísimo volumen sobre la Distribución de las Aves en Colombia no menciona esta especie. Los Señores Todd y Carriker en su obra sobre las aves de la Región de Santa Marta, Colombia, tampoco hacen mención y en ninguna obra se ha estudiado la presencia y distribución de esta águila en Colombia, a excepción de estar incluida en el área de dispersión. No se ha citado un solo ejemplar obtenido en territorio colombiano, y la única nota publicada hasta hoy es la que aparece en el N° 3 de "Caldasia" Boletín del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, en que se anota el hecho de haber sido observados dos ejemplares en los Llanos Orientales del Meta en la Región de Quenane, a orillas del Caño del mismo nombre. También se dió ahí una corta descripción de los ejemplares que nos ocupan en el presente trabajo.

Los ejemplares en que se basa esta corta revisión fueron obtenidos por el señor Kjell von Sneidern, colector sueco, domiciliado en el país desde hace más de diez años y a cuyos trabajos

de exploración y recolección se debe el conocimiento de algunas nuevas formas de mamíferos, aves, insectos y plantas colombianas, así como la adición de muchas especies a la Fauna y Flora de Colombia. El señor von Sneider es un activo e incansable trabajador, que prepara sus materiales de manera irreprochable y quien nos ha suministrado datos muy valiosos sobre las costumbres y distribución de especies poco conocidas. La mayoría del material obtenido por von Sneider se encuentra en el Museo Real de Historia Natural de Estocolmo, en la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia y en el Museo Field de Chicago. Nosotros también tenemos algunas colecciones obtenidas de von Sneider y ya me ocuparé más tarde de algunas otras especies interesantes de nuestra fauna, pertenecientes a estas colecciones.

Algunos datos tomados de las observaciones de Wied, Burmeister, Schomburgk, Tschudi y Pelzeln. Según ellos esta águila está distribuida sobre la mayor parte de Sur América y vive principalmente en las selvas cerca de las costas y en los bosques de las sabanas y de preferencia a orillas de los ríos. Estas observaciones concuerdan con las que sobre esta especie me ha suministrado mi amigo von Sneider y con las mías personales. También dicen ellos y especialmente Schomburgk, que le gusta posarse sobre los árboles secos más altos del bosque, donde permanece horas enteras inmóvil y solamente levanta de tiempo en tiempo su espléndido copete. Dice asimismo, que construye su nido en lo más alto de los árboles en lugares inaccesibles, y que se distingue de la arpía por su fuerte grito. Tuve ocasión de oír el grito de esta especie cuando encontré los dos ejemplares a orillas del Quenane en los Llanos. Estaban las dos paradas en lo más alto de un árbol a eso de las dos de la tarde, armando un gran alboroto a dúo que podía oírse a cierta distancia. Ambos ejemplares eran de coloración muy clara lo que me hace suponer que eran muy jóvenes. Al querer hacercarme para tirarlos, volaron a través de un potrero angosto y después de alcanzar el bosque vecino y penetrar algún

trecho a través de los árboles, desviaron la dirección original en ángulo recto y siguieron volando por un trecho más hasta pararse en los árboles más altos y secos del bosque cerca del agua. Una vez más intenté matarlas, pero se fueron antes de poderme acercar lo necesario para alcanzarlas con escopeta. Por esto creo acertado lo que dice Brehm de que solamente pueden tirarse con rifle u obtenerlas por medio de los indios. Estos son habilísimos cazadores y logran acercarse sin hacer el menor ruido. Los ejemplares obtenidos por Von Sneidern en el Chocó, según me lo manifestó él, fueron casi todos matados por los indios.

El grito de esta águila se parece algo al de Hypomorphnus urubitinga, pero es más fuerte y variado. Según Schomburgk - Reisen in Britisch Guiana, Tome III p.738.- "Esta hermosísima rapaz es una de las más grandes de la Guayana Inglesa". Ellos la encontraron con frecuencia en las vecindades de las serranías de Tuarutu y Canuku, y muy rara vez en la costa. A menudo la observaban en los altos árboles de las orillas de los ríos o volando sobre la selva en círculos perfectos. Según Schomburgk, hace un nido enorme. Parece que hace presa en las especies mas pequeñas de monos.

Eduardo Röhl en su trabajo sobre "Las Aves de Rapina Diurnas" de Venezuela, p. 43. 1933; cita esta especie, pero no da datos sobre observaciones personales, limitándose a apuntes las observaciones de Schomburgk. Tampoco nos da ninguna información sobre la obtención de ejemplares en territorio venezolano, indicando el área de dispersión: "Venezuela, Colombia, Guayana, Perú Este y Paraguay".

Durante los tres últimos años se ha logrado obtener relativamente un buen número de ejemplares de esta águila en Colombia. En el año de 1940, el señor von Sneidern logró obtener en el Chocó siete ejemplares, de los cuales cuatro pertenecen ahora a la colección del Instituto y los otros fueron enviados al Field Museum de Chicago. También a fines de 1941, el mismo von Sneidern obtuvo dos ejemplares más, ambos jóvenes, en Belén, Caquetá, al sureste del país. Mr. M. A. Carriker, Jr co-autor de la obra sobre las Aves de la Región de Santa Marta, Colombia y gran conocedor de las a-

ves neotropicales, muy gentilmente me ha enviado informaciones sobre las especies de rapaces obtenidas por él durante el año de 1941 en la Guajira y la parte nororiental del Departamento del Magdalena. El señor Carriker está haciendo unas magníficas colecciones para el Museo Nacional de los Estados Unidos. Estos trabajos comenzaron en marzo de 1941 bajo la dirección de mi gran amigo el Dr. Alexander Wetmore, Director del Citado Museo. Tuve la suerte y el placer de poder acompañar al Dr. Wetmore y a Mr. Carriker durante algún tiempo mientras coleccionábamos y estudiábamos en las regiones de Caracolito y Riohacha en el Magdalena y en Maicao, Guajira. Mi amigo Mr. Carriker logró obtener ejemplares de Morphnus en Carraipía, en la parte sur de la Guajira, según me informa en comunicación especial. ~~III~~.

Según los autores anteriormente citados del siglo pasado, esta águila se alimenta principalmente de pequeños monos y también de aves. El Príncipe de Wied encontró en el estómago de un ejemplar que le fué entregado todavía vivo un opossum (chucha o zarigüeya), y los indios aseguran que se alimenta de monos. Esto parece confirmarlo el nombre vulgar con que se la conoce en Colombia de Aguila Churuquera que viene de "Churuco", nombre que se da en algunas regiones al Lagotrix o mono de Humboldt, también se la llama águila miquera en los Llanos, gavián miquero en el Chocó; puede ser, y casi tengo la certeza de ello, que, la confunden con su más próxima semejante, pero mucho más grande Águila Arpia, que habita más o menos las mismas regiones y cuyo rémigen alimenticio consta casi únicamente de Monos y Perezosos, y debo confesar que la primera impresión que tuve al ver el Aguila Churuquera en estado libre, fue la de que tenía ante mis ojos una Arpia joven, mas al estudiarla despacio con el anteojo salí de mi error.

Esta es un águila de formas elegantes, con el tamaño y la robustez del águila y la forma del Azor. Sus alas cortas, muy anchas y redondeadas, su amplia y larga cola le permiten volar con gran agilidad por enmedio del ramaje de los grandes árboles de las selvas

Tropicales en persecución de los monos y pequeños mamíferos que constituyen su principal alimento. Sin embargo el Sr. Von Sneidern me escribe sobre sus observaciones con respecto a las costumbres de estas águilas: "Yo ví a estas águilas varias veces en la Cordillera del Deriën. Siempre estaban en las ramas bajas de los árboles, jamás en las copas o en lo mas alto de los mismos. En dos ocasiones las ví comiendo tucanes. También las encontré con barro en las patas, por lo cual presumí que capturaran reptiles. Esta sospecha se confirmó cuando estuve sobre la Cordillera del Baudó dónde observé a una de estas águilas con una enorme culebra en las garras. Son más frecuentes en el Chocó, que en la Región de "La Morelia" en el Caquetá".

Estas observaciones prueban claramente que estas aguilas tambien atacan a los reptiles como la generalidad de las rapaces. Pero están en contradicción con las de la mayoría de los observadores y con las mías personales en cuanto a que estas aves prefieren las ramas bajas de los árboles. En un viaje recientemente realizado a los Llanos del Meta, yo observé en la región de Remolino un hermoso ejemplar de esta especie que voló de una palma que se encontraba a poca distancia del bosque, a un árbol, el más alto que se encontraba al borde del bosque, situándose en una de las ramas más altas y dónde empezó a lanzar su peculiar grite. La región era algo pantanosa y por debajo del bosque corría un caño bastante caudaloso.

F. Carlos Lehmann V.
F. Carlos Lehmann V.

Bogotá, Abril de 1943.