NUEVAS ADICIONES
A LAS AVES DE COLOMBIA.

0322

F. C. Lehmann V.

Falco peregrinus cassini Sharpe.

Falco cassini Sharpe, Ann. and Mag. Nat. Hist. (4), 11, 1875,
p. 221. (Estrechos de Magallanes y Chile)

La distribución de esta forma pálida de Halcón Peregrino no ha sido fijada con exactitud, pero se sabe que anida en Chile y posiblemente más al norte, según Peters - Check-List Bds. World p. 290, 1, 1931. - Swann - Monogr. Bds. Prey- dice que se encuentra desde los Andes del Ecuador hasta Chile, Patagonia y las Islas Falkland.

Yo observé en Junio de 1937 en la región de Puracé (Cauca), un ejemplar de esta especie, que por entonces no logré identificar. Recientemente durante mis observaciones y estudios en la región del Patía en el Departamento del Cauca, pude observar con detenimiento un ejemplar bien adulto de Falco peregrinus cassini, logrando identificarlo con certeza.

Es esta la primera vez que se menciona la presencia de esta especie en Colombia.

Neomorphus radiolosus Sclat. & Salv.,

Neomorphus radiolosus Scl. & Salv., P. Z. S. 1878, p. 439. (Intaj, Ecuador.)

Ejemplar examinado: 1 ♂ ad. Col. Sneidern.

Parece que existen solamente cuatro ejemplares de esta curiosa y escasa ave en las colecciones científicas. Tres de los cuales obtenidos en el Ecuador se encuentran en Europa; dos en Inglaterra y uno en Suecia. El cuarto ejemplar pertenece a la colección del Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca en Popayán. Fué obtenido en "La Costa" vertiente

del Pacífico de la Cordillera Occidental, a una altura de 1.000 metros sobre el nivel del mar, en el Departamento del Cauca el 15 de febrero de 1937. Este es el único ejemplar de esta rarísima especie que se ha obtenido en Colombia, extendiéndose así su área de dispersión hasta nuestro país. Fué cazado cuando acababa de coger un lagarto.

Anas rubripes subsp. Brewster.

Con frecuencia se obtienen ejemplares de patos pertenecientes a esta especie en diferentes partes de Colombia. Yo he visto ejemplares hembras obtenidos por cazadores en la Sabana de Bogotá y en Fúquene, y un bello macho obtenido en el Valle del Cauca no lejos de Cali. En la Sabana se lo llama Picodloro y en el Valle Pato amarillo.

Por llegar estos patos en plumaje de invierno no puedo referir nuestros ejemplares a ninguna de las razas conocidas.

Dafila spinicauda (Vieillot).

Anas spinicauda Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., 5, 1816, p. 135.

(Buenos Aires.)

Varios ejemplares de este pato fueron obtenidos por K. v. Sneider en las lagunas del Páramo de Cumbal, Nariño en 1941.

Sarkidiornis carunculata (Lichtenstein).

Anas carunculata Licht., Abh., K. Akad. Wiss. Berlin, Phys. Kl.,

1816-17 (1819) p. 176. (Brasil, ex Marcgrave.)

Algunos ejemplares de esta variedad de pato de la fauna oriental de Sur América han sido obtenidos en el Occidente de Colombia. Tres fueron cazados en Popayán en 1936, de los cuales una hembra conservé viva por algún tiempo. Recientemente examiné en Cali un ejemplar macho adulto en la colección de Don Guillermo Martínez, Presidente del Club de Cazadores de Cali.

Este ejemplar fué obtenido por él el año pasado en los alrededores de Cali. Se señala como área de dispersión para esta especie (Peters): Sur América tropical oriental desde Venezuela hacia el sur hasta el norte de la Argentina, Paraguay y el sur del Brasil (Sao Paulo).

Erismatura (Oxyura) ferruginea Eyton.

Erismatura ferruginea Eyton., Monogr. Anat., 1838, p.170 (Chile)

Se dá como área de distribución a esta especie (Peters): Lagos Andinos del Perú y Bolivia.

Esta variedad de pato es frecuente en las lagunas de los páramos de las cordilleras Central y Oriental de Colombia y en la Laguna de Fúquene entre Guadánamarca y Boyacá. Yo he obtenido ejemplares en Fúquene, lagunas del Páramo de Zuma Paz, Cordillera Oriental y Laguna de San Rafael, Páramo de Puracé en la Cordillera Central. También he visto ejemplares obtenidos en la Sabana de Bogotá y en el Páramo de Cumbal, Nariño. Es posible que los ejemplares colombianos representen una variedad nueva, pero por falta de material topotípico de ferruginea para comparación, por el momento refiero los ejemplares examinados por mí a esta raza.

Bubo virginianus nigrescens Berlepsch.

Bubo nigrescens Berlepsch, Proc. Zool. Soc. 1884, p. 309 (Montañas
de Cechce, 5.000 metros, Ecuador occidental).

Yo he logrado obtener dos ejemplares 1 ♂ y 1 ♀ en la localidad
de Peñablanca, Cordillera Central, vertiente occidental, al oriente de
Popayán, a una altura de 2800 metros sobre el nivel del mar. ~~Entre los~~
~~meses de verano de esa región o sea entre junio y agosto, el primero en~~
julio de 1936 y el segundo en agosto de 1937. Al parecer son estos los
primeros ejemplares de esta raza de Gran Duque que se obtienen en Colom-
bia.

del Pacífico de la Cordillera Occidental, a una altura de 1.000 metros sobre el nivel del mar, en el Departamento del Cauca el 15 de febrero de 1937. Este es el único ejemplar de esta rarísima especie que se ha obtenido en Colombia, extendiéndose así su área de dispersión hasta nuestro país. Fué cazado cuando acababa de coger un lagarto.

Anas rubripes subsp. ~~brasiliensis~~

Con frecuencia se obtienen ejemplares de patos pertenecientes a esta especie en diferentes partes de Colombia. ~~Se~~ He visto ejemplares hembras ~~obtenidos~~ ^{matados} por cazadores en la Sabana de Bogotá y en Fiquene, y un bello macho ~~obtenido~~ ^{cazado} en el Valle del Cauca no lejos de Cali. En la Sabana ^{de Bogotá} se ~~le~~ llama "Picodioro" y en el Valle "Pato amarillo".

Por llegar estos patos en plumaje de invierno no puedo referir nuestros ejemplares a ninguna de las razas conocidas.

Dafila spinicauda (Vieillot).

Anas spinicauda Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., 5, 1816, p. 135.
(Buenos Aires).

Varios ejemplares de este pato fueron obtenidos por K. v. Sneidern en las lagunas del Páramo de Cumbal, Nariño, en 1941.

Sarkidiornis carunculata (Lichtenstein).

Anas carunculata Licht., Abh. K. Akad. Wiss. Berlin, Phys. Kl.,
1816-17 (1819) p. 176. (Brasil, ex Marcgrave).

Algunos ejemplares de esta ~~variedad~~ ^{especie} de pato de la fauna oriental de Sur América han sido obtenidos en el Occidente de Colombia. Tres fueron cazados en Popayán en 1936, de los cuales una hembra conservé viva por algún tiempo. Recientemente examiné en Cali un ejemplar macho adulto en la colección ^{don} de Don Guillermo Martínez, Presidente del Club de Cazadores de Cali.

Este ejemplar fué obtenido por ^{señor Martínez} él / el año pasado en los alrededores de Cali.

Peters ~~se~~ ^e señala como área de dispersión para esta especie ~~(Peters)~~: Sur América tropical oriental desde Venezuela hacia el sur hasta el norte de la Argentina, Paraguay y el sur del Brasil (São Paulo).

Erismatura (Oxyura) ferruginea Eyton.

Erismatura ferruginea Eyton., Monogr. Anat., 1838, p.170 (Chile).

Peters ~~se~~ dá como área de distribución ^{de} esta especie ~~(Peters)~~: Lagos Andinos del Perú y Bolivia.

Este ^e ~~variedad~~ ~~pato~~ es frecuente en las lagunas de los páramos de las cordilleras Central y Oriental de Colombia y en la Laguna de Fúquene entre Cundinamarca y Boyacá. Yo he obtenido ejemplares ^{tanto} en Fúquene ^{como en las} lagunas del Páramo de ^{Sumapaz} ~~Zuma-Paz~~ (Cordillera Oriental) ^{en la} y Laguna de San Rafael, Páramo de Puracé, ~~esta~~ (Cordillera Central). También he visto ejemplares ^{cazados} ~~obtenidos~~ en la Sabana de Bogotá y en el Páramo de Cumbal, Nariño. Es posible que los ejemplares colombianos representen una ^{subespecie} ~~variedad~~ nueva, pero por falta de material topotípico de ferruginea para comparación, por el momento refiero los ejemplares examinados por mí, a esta raza.

BUBONIDAE *aves alatas*

Bubo virginianus nigrescens Berlepsch.

6

Bubo nigrescens Berlepsch, Proc. Zool. Soc. 1884, p. 309 (Montañas
de Cechce, 3.000 metros, Ecuador occidental).

Yo he logrado obtener dos ejemplares (1 ♂ y 1 ♀) en la localidad
de Peñablanca, Cordillera Central, vertiente occidental, al oriente de
Popayán, a una altura de 2800 metros sobre el nivel del mar. Ambos en los
meses de verano de esa región o sea entre junio y agosto, el primero en
julio de 1936 y el segundo en agosto de 1937. Al parecer son estos los
primeros ejemplares de esta raza de Gran Duque que se obtienen en Colom-
bia.