

Leucopternis princeps zimmeri Friedmann

Ejemplar examinado: 1 ♂ adulta, de ^{Landáguiri} ~~Contratación~~ (Depto. de Santander), Col.
Hno. Nicéforo, Julio ¹⁹³⁹ 1939.- Mus. Inst. La Salle, Bogotá.

Al dar esta denominación al primer ejemplar de esta rarísima águila que ha sido hallado en Colombia, sigo el criterio de H. Friedmann quien en The Auk Vol LII, para enero de 1935, distingue dos razas de Leucopternis princeps restringiendo la raza típica a Costa Rica y el Occidente de Panamá y dando a los ejemplares del Ecuador un nuevo nombre subespecífico.

El ejemplar que me ocupa pertenece a la colección del Museo del Instituto de La Salle, en Bogotá. Fué obtenido en ^{Landáguiri} ~~Contratación~~, (Depto. de Santander), en la ^{hoya del Río Carare, cabeceras del Río Guayaquito} ~~parte alta del valle del río Sogamoso~~, por el Rev. Hermano Nicéforo en el mes de julio de 1939. El Hno. Nicéforo muy gentilmente me lo envió para su identificación, y me ha permitido hacer la presente publicación, por lo cual le quedo sinceramente agradecido.

La coloración de este ejemplar se ajusta a la que describe Swann en su obra "Monograph of the Birds of Prey", p.474. Esta misma coloración tenía un ejemplar, probablemente de esta misma especie, que obtuvo el Sr. Kjell von Sneltern en el Chocó en 1940, al cual vi yo muy superficialmente en Diciembre de ese mismo año. Lo mismo que el de Santander, el del Chocó era adulto. Es probable que este último fuera L. princeps princeps por razones geográficas, pero en cuanto al de Contratación, no puedo menos que identificarlo con L. p. zimmeri por razón de sus dimensiones; en efecto, las alas de este ejemplar 358 mm., la cadera 201 mm., el culmen (sin cera) 35 mm., el tarso 90 mm., la longitud total es de 555 mm.

Compárense estas dimensiones con las siguientes, señaladas por Friedmann (loc. cit.) al tratar de la forma zimmeri:

<u>Leucopternis princeps princeps</u>	Ala	Cola	Culmen (sin cera)
♂	364-367	210-223	29,5-31
♀	380-388	225	32
<u>Leucopternis princeps zimmeri</u>	Ala	Cola	Culmen (sin cera)
♂	350-352	191	29-30
♀	351-358	201	30,5-35

El Dr. A. Dugand en su trabajo sobre las Rapaces Colombianas (Rev Acad. Colomb. Cienc. IV, 16: 401, 403 et 404. 1941) incluyó la especie princeps como posiblemente existente en Colombia ya que se había señalado tanto en Costa Rica como en el Ecuador. Lo interesante del hallazgo de L. p. zimmeri en el nordeste de Colombia, lejos de la Costa del Pacífico donde, con toda probabilidad como lo indicó el Dr. Dugand, debe existir la raza típica princeps, es que ambas razas están representadas en Colombia. Proximamente haré una exploración de una parte de la Vertiente del Pacífico y espero tener la buena suerte de confirmar allí la presencia de la raza típica.

J. Carlos Lehmann.