

#4

0355

Tachytriorchis albicaudatus exiguus Chapman, Bull. A. M. N. H.,
34, 1915, p.637. (Barrigón, Colombia).

Buteo albicaudatus colonus Stresemann, Journ. Orn., 1925, p.315;
Peters, Check-list Bds. World, 1, 1931, p.228.

Buteo albicaudatus hypospodius Swann, Monogr. Bds. Prey, 1, pt.17,
1928, p.41; Rohl, Las Aves de Rapina Diurnas de Venezuela, 1933,
p.55.

Distribución: Llanos Orientales de Colombia desde la región de A-
piay cerca a Villavicencio, hacia el este. Posiblemente tambien en el
interior de Venezuela.

Caractéres.- ♂ ala 398-411; cola 162-193; ♀ ala 425-433; cola 182;
tarso 83 mm. Largo total ♂ ad. 464; culmen 29 mm. Iris café oscuro;
cera amarillo verdosa; patas amarillas. Coloración general por encima
mas oscura que las dos razas anteriores, con la coloración apizarrada os-
cura de la garganta avanzando más hacia el pecho y lados de éste también
mas oscuros, semejandose en esto a peccilochrous.

Al tratar de sacar en limpio lo que se conoce sobre esta forma de Bu-
teo albicaudatus, sigo al Dr. Frank M. Chapman, quien en su estudio sobre
la "Distribution of Bird Life in Colombia" describe esta subespecie en la
forma siguiente: "Caractéreas subespecíficos: Closely resembling T. a. sen-
netti (Allen) but notably smaller with the upperparts, particularly the
head and sides of the neck, darker and more slaty." (p.242, 1917)

Como dice el Dr. Chapman l.c., al describir esta variedad, es sumamen-
te parecida a B. a. sennetti, hoy considerado como hypospodius. También se
asemeja mucho en coloración al B.a. albicaudatus de las regiones del sur
del Continente, pero es tamaño bastante menor. Se diferencia principalmen-
te de colonus y de hypospodius por la característica de la garganta mas os-
cura que en estos y por su menor tamaño. También la coloración general de

las partes superiores es mas oscura. De mas de veinte ejemplares examinados, la mayoria de los adultos tiene la garganta oscura; solamente un macho adulto tenia la garganta blanca como hypospodius, y aún este ejemplar que conservé vivo por espacio de casi dos años, después de un tiempo se le puso la garganta oscura como a su compañera. Este detalle es curioso y es posible que suceda lo mismo con ejemplares de las otras dos razas antes descritas y no debería considerarse como factor esencial.

Mientras hypospodius y colonus tienen en general una coloración gris pizarra o ceniciento azulado por encima, exiguus posee una coloración mucho más oscura sobre todo en las alas; la cabeza, lados de la cara, la nuca y garganta pizarra negra. En los lados del pecho la coloración oscura avanza mas que en B. a. hypospodius o B. a. colonus como ya antes anoté, y las tibias en ejemplares adultos de esta raza están listadas con barras tenues café rojiza menos apinada que en colonus cuyas tibias están listadas en la parte superior con barras de un color rojizo herrumbre bastante tupidas. El área rojizo herrumbre de las hombros se extiende hasta las escapulares como en hypospodius y colonus, su intensidad y extensión varía y esto se debe posiblemente a la edad.

El adulto es muy semejante en ambos sexos, siendo quizá las hembras un poco más oscuras que los machos y de mayor tamaño. La cola blanca en el centro y gris plateada hacia los lados, presenta 8 a 9 líneas irregulares transversales que se espacian más en los individuos mas viejos, pasando del color castaño café al gris muy oscuro; tienen estas líneas una disposición variable y diferente a la que presentan en colonus, raza con la cual se ha querido identificar esta forma. Las alas sobrepasan la cola en una longitud que no es constante como puede verse a continuación: ♂ ad. piel 45-50; ♀ ad. piel 54-60; 2 ♀ ads. montadas 76-91.-

Un ejemplar en plumaje de primer año presenta una coloración general oscura casi negra por encima y por debajo, siendo la cola más clara; la

cabeza, la nuca, la espalda y las alas negro café; las coberteras supra-alares bordeadas hacia la punta de castaño rojizo; primarias y secundarias más oscuras; garganta negra, lados de la barba con unas pocas plumitas blanquiscinas; auriculares y superciliares amarillentas y ocráceas claras; en la parte superior y central del pecho se alcanza a notar ya el comienzo de la mancha amarillenta, especialmente hacia la mitad de las plumas que tienen la base blanca; la parte inferior del abdomen y coberteras subcaudales blanco amarillento un poco más claro hacia los lados y palpidas y rayadas de café; tibias blanco amarillentas y manchadas de café oscuro, mas oscuras hacia el lado de afuera. En los bordes de los hombros y hacia la base se notan trazos del color rojizo herrumbre bordeando las plumas, que, en esta parte se hallan notablemente pintadas con blanco; la región de los hombros es un poco más oscura que el resto del ala en esta parte; sobre las secundarias hay rastros de coloración más oscura en forma de cuatro sombras transversales y una banda más ancha en el extremo de las plumas; las coberteras subalares pequeñas son de color café muy oscuro, rayadas y terminadas con amarillento y blanquecino; axilares café negras moteadas en la base de blanco; grandes coberteras subalares blancas inconspicuamente listadas de negro café; extremo de las primarias por debajo negro, mas claras hacia la base que es blanca; la cola es mas larga que en los adultos, las alas la sobrepasan unos 10 mm. o llegan solamente al final; es de color café grisoso y listada transversalmente con numerosas barras mas oscuras por encima; la pina interior por encima es blancuzca en el borde y hacia la base; coberteras supra-caudales café oscuro en el centro y blancas hacia los lados; rabadilla café con las plumas blancas en la base y marginadas de amarillento; cola por debajo gris blanquecino sucio con trazos de barras irregulares más oscuras que se van desvaneciendo hacia la base que es blanca.

Prematuro en el tercer año. - Esta fase intermedia presenta una co-

loración general muy oscura, casi negra, pero ya la cola es más corta, de coloración más clara con un fondo gris ceniza y empieza a notarse la banda ancha subterminal que aún no es bien definida y de color café oscuro, las barras transversales son muy notorias en la pina interior de las plumas cuyo borde y hacia la base es casi blanco salpicado de café, en dos ejemplares en este estado las alas sobrepasan la cola en 30 y 35 mm.; en ambos se nota claramente la punta blanquecina de las rectrices; la cola en general tiene un color gris blanquecino o plateado que llega casi al blanco en uno de los ejemplares, se notan muy distintamente las barras transversales oscuras en número de 8 o 9, principalmente en el lado interior de las plumas; las tibias son más claras que en los jóvenes y tienen un fondo amarillento o blanquecino, conspicuamente barreteadas de pardo oscuro o negro café; las coberteras ^{inferiores} de la cola empiezan a tomar una coloración muy clara y luego las tibias; las plumas del abdomen son negras o café muy oscuro marginadas de blanco o amarillento, las de los flancos y el pecho presentan este mismo carácter, pero menos marcado; el centro del pecho presenta una conspicua mancha amarillenta.

Después de esta fase viene ya rápidamente la coloración definitiva del adulto, empezando por la cola y las tibias y terminando entre el pecho y el abdomen, y los flancos. En mi opinión estas águilas llegan a su coloración definitiva entre los 4 y 5 años.

El problema de los Buteos suramericanos, es sumamente complejo. Me parece que se ha descuidado este género un poco y de ahí provienen las confusiones, pues muchos se contentan con seguir a ojo cerrado a otros autores sin pararse a estudiar por su propia cuenta detenidamente sus materiales. No pretendo, en este corto trabajo, dejar definida la cuestión, pues carezco por el momento de materiales suficientes para ello, pero si quiero despertar un poco más de interés sobre el particular para ver si en un futuro próximo pudiera aclararse la cuestión.

de los Buteos de la America Tropical.

Las costumbres de esta forma han sido poco estudiadas. Viven en las sabanas del oriente de Colombia y posiblemente se hallan también en los llanos del interior de Venezuela. Con frecuencia se las vé paradas en árboles secos, sobre los matorrales y chaparrales bajos o sobre los postes del telégrafo y de las cercas; algunas veces también en el suelo sobre una piedra o una eminencia del terreno y esto ocurre generalmente después de que han devorado alguna presa para lo cual han bajado al suelo. Desde los postes o copas de los árboles escudriñan con su aguda vista todos los alrededores para descubrir su presa que consiste en su mayor parte en langostas, escarabajos, lagartos, culebras, roedores y raramente aves. Entre éstas caza principalmente las de costumbres terrestres, cuando tienen polluelos, para alimentar a sus aguiluchos.

Anidan en los pequeños bosques o grupos de árboles tan frecuentes en los Llanos, o en matorrales aislados. Construyen su nido por lo general a poca altura del suelo, de ramitas que ellas mismas quiebran de los árboles y de chamizas secas que recojen. Esta raza y colonus prefieren las sabanas bajas cubiertas de pastos y las tierras planas en climas tropicales, mientras hypospodius, en Colombia, frecuenta las regiones montañosas de terreno quebrado y suben en las faldas de las cordilleras hasta la región subtropical.

Los ejemplares estudiados en el presente trabajo han sido coleccionados en los distintos meses del año y durante los últimos cinco años en los Llanos del Meta, desde Apiay hasta Remolino.

BUTEO POECILOCHROUS Gurney

III-1945

Buteo poecilocheus Gurney, Ibis, 1879, p.176, (Yauyacu, Ecuador).

Buteo melanosternus Berlepsch y Stolzmann, Ornith., 1906, p.

104. (Cuzco, Perú).

Buteo erythronotus simonsi Swann, Syn. Accip., ed. 2, 1922, p.85.

(Challapata, Bolivia).

Buteo poecilocheus Chapman, Bull. Am. Mus. Nat. Hist. Vol.55,

1926, p.229; Peters, Check-list, Bds. World, 1, 1931, p.229.

Distribución: En los Andes desde el Norte del Ecuador hasta el noroeste de la Argentina (Peters). Zona templada; Norte de Argentina hasta el norte del Ecuador (Chapman). Cordilleras Occidental y vertiente Occidental de la Central en Colombia hasta el Tambo y Popayán, y Valle del río Patía en el Cauca. (Dugand, Lehmann).

Caractéres.- Mayor que B. albicaudatus, mas fuerte. ♂ ala 410, cola 190; tarso 91; culmen 27 m.m. ♀ ala 435-470; cola 195-210; tarso 91; culmen 31 mm.

Adulto.- (fase clara ♀). Cabeza, nuca, lados de la cara, barbilla, lados del pecho y parte superior central de la espalda negro pizarra claro, margenes de las plumas ligeramente mas claros. Parte central y superior del pecho blanca prolongandose este color hacia arriba casi hasta la barbilla. Partes inferiores y flancos listados con barras irregulares café rojizas, mas rojizas hacia los flancos; tibias blancas listadas de café rojizo, mas rojizo hacia la rodilla que hacia el talón. Espalda negro pizarra como la nuca, las escapulares en su mayor extensión de color rojizo herrumbre con los centros oscuros; hombros con una gran área de color rojizo herrumbre más intenso y más extendido que en albicaudatus, estas plumas con líneas astilares negruscas. Coberteras pequeñas y medianas negro pizarra con brillo metálico, las mayores mas claras y listadas con barras más oscuras y ancho margen oscuro. Secundarias gris parduzco listadas con 6 a 7 barras onduladas más oscuras y un ancho margen también

oscuro, ligeramente marginadas de blanquecino o amarillento. Primarias más oscuras que las secundarias y barreteadas solamente en el lado interior de las plumas y casi completamente negras hacia las puntas en bastante extensión. Coberteras subalares blancas, densamente listadas con barras irregulares que varían del café negro al café rojizo o ferruginoso, las mayores con gris parduzco. Superficie inferior de las primarias blanca en la base, barreteadas en la pina interior en el centro y negruscas en el resto. Superficie inferior de las secundarias gris ceniza listadas transversalmente con barras negro café y con una banda final ancha del mismo color. Axilares blancas densamente barreteadas con castaño rojizo. Rabadilla blanca fuertemente manchada con gris y ferruginoso y listadas irregularmente por barras café rojizas, haciéndose mas blancas hacia la cola. Coberteras supracaudales blancas en los lados, las centrales listadas con negro café y lavadas con gris parduzco. Cola blanca con una banda ancha subterminal negra, hacia los lados tiznada con gris ceniza y listada transversalmente con 7 barras angostas e irregulares de color café negrusco y terminada en un angosto margen blanco; entre el angosto borde blanco y la banda negra hay una zona gris parduzca. Coberteras subcaudales blanco puro. Lado inferior de la cola blanco, con una ancha banda subterminal negra café y bordes blancos mas anchos que en el lado superior.

Iris castaño rojizo oscuro; cera gris amarillo-verdosa; patas amarillo cromo; pico azul de cuerno mas claro en la base; uñas negras.

♂ ad. (fase blanca) Muy semejante al plumaje que acabo de describir para la hembra, pero mas blanco por debajo acercándose en esto a B. albicaudatus, las barras restringidas a los flancos. La rabadilla igualmente mas blanca y listada transversalmente con barras herrumbrosas. Coberteras supracaudales completamente blancas. Cola igual que en el anterior.

♀ ad. (fase negra) Cabeza, nuca, espalda, garganta, pecho y flancos negro pizarra algo plomizo. Tibias castaño avellana tiznadas en el lado exterior de negrusco o pizarra. Escapulares pizarra negro, las menores sal-

picadas de castaño avellana; primarias y secundarias con fondo gris ceniza listadas transversalmente por 7 a 8 barras mas oscuras y una ancha banda subterminal del mismo color, los bordes blanquecinos. Coberteras supra-alares mayores mas oscuras y listadas en la misma forma; coberteras menores en los hombros castaño avellana formando una mancha muy conspicua. Rabadilla bastante blanca, pero notablemente salpicada de plumizo oscuro o pizarra y listada de café negro; coberteras supracaudales más blancas que la rabadilla y salpicadas y listadas en la misma forma. Cola por encima blanca, los lados externos de las plumas ceniciento grisoso, atravezada por 6 a 7 angostas barras irregulares café negro y ancha banda subterminal negra. Pecho, flancos y parte alta del abdomen notablemente salpicadas o lavadas con castaño avellana; parte inferior del abdomen y crista castaño avellana tiznado con plumizo negro. Coberteras subcaudales blancas listadas transversalmente con barras irregulares café oscuro. Cola por debajo blanca con banda subterminal negra. Alas por debajo gris ceniciento barreteadas con 8 a 9 barras oscuras y una ancha banda terminal del mismo color. Coberteras infra-alares mayores un poco mas oscuras, las medianas pizarra listadas de blanco y las menores castaño avellana.

♂ ad. (fase negra) muy semejante a la fase que dejo descrita para la hembra, pero las tibias avellana barreteadas de blanco, y la coloración oscura general mas clara que en la hembra, sobre todo en el pecho y la cabeza que son casi pizarra plumizo o ceniciento.

Joven : (fase oscura) Por debajo café achocolatado salpicado y manchado con amarillento rojizo; por encima mezclado entre rojizo y pardo; cola gris con bastantes lineas transversales negra pizarra.

Joven : (fase clara) Por encima apizarrado café; cola gris listada como en el anterior. Por debajo mas claro.

- - - - -

Hasta hace poco no se habia señalado la presencia de esta hermosa

aguila en Colombia y se la citaba únicamente desde el Ecuador hacia el sur. En agosto de 1936 tuve la suerte de obtener un ejemplar en el sitio de Paloverde, Patía, Cauca y poco tiempo despues von Sneidern obtuvo otro en Pavas sobre la Cordillera Occidental. De estos dos primeros records dí cuenta en "Caldasia" Vol 2, No.7, 1943, p. 185. Durante el año pasado tuve la suerte de poder visitar con frecuencia las localidades de Paloverde y Diego-Pérez en el Patía, Municipio del Bordo, gracias a la gentileza y generosidad de mi amigo don Gerardo Garrido, propietario de una hacienda en esas comarcas. Durante estas visitas logré obtener algunos ejemplares mas de Buteo poecilocheus y hacer muy interesantes observaciones sobre sus costumbres, alimentación y habitat favoritos.

En la localidad de Paloverde observé un nido casi destruido ya por el viento y las lluvias. Estaba formado por chamizas y colocado sobre la cima de un higuerón (Ficus) que crecía sobre la pared de una gran roca. La primera vez que me acerqué por el lado de encima de la roca estaba un ejemplar macho adulto parado sobre el nido. Inmediatamente se lanzó al aire y se remontó describiendo espirales a la manera típica de los Buteos. Poco despues apareció su compañera, un gremoso ejemplar en plumaje blanco, mientras que el macho ostentaba la coloración oscura. De éstos logré capturar el macho que ahora forma parte de la colección del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional en Bogotá y cuyo plumaje dejo descrito arriba. Como 15 dias mas tarde regresé al mismo sitio y encontré que la hembra de este sitio ya había conseguido otro compañero en la misma fase de coloración que el que perdió. Esta vez logré matar ambos ejemplares, de los cuales la hembra forma parte ahora de la colección del Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca.

En la región de Diego Pérez y sobre las rocas que miran hacia el fin Patía, hay unas dos parejas que con frecuencia estuve observando. Estas están compuestas ambas por ejemplares en la fase oscura del plumaje, tanto

el macho como la hembra. Estudiando cuidadosamente los sitios frecuentados por ellas para descansar encontré restos de su alimentación consistentes en huesitos de ratones, de Columbigallina, pero sobre todo de restos de escarabajos. En los estómagos de los ejemplares preparados encontré ^siempre lagartos de mediano tamaño. Otras parejas de estas bellas aguilas fueron observadas en las vecindades. De estas había una pareja compuesta por ejemplares en plumaje blanco.

Pude comprobar que estas aves prefieren los riscos escarpados característicos de esa zona a las sabanas. No logré observar ni un solo ejemplar joven. Me informaron los de la región que ellas anidan entre enero y marzo.

Debido a las diferencias tan marcadas en la coloración de esta especie fué durante mucho tiempo confundida con otras como polyosoma o con fases de albicaudatus, sin embargo ultimamente se ha llegado a la conclusión de que es una especie diferente como lo demuestran su mayor tamaño y su fórmula lar en la que la 4a. pluma primaria es la mas larga, mientras que en polyosoma lo es la 3a., y de albicaudatus de diferencia ante todo por su cola más larga.

Estas aguilas se ven con frecuencia volando sobre los riscos y las lomas en busca de alimento. Durante el verano cuando se queman las lomas de paja acuden en seguida para atrapar los insectos, reptiles y demás alimañas que acosados por el fuego salen de sus escondites. Su grito es muy semejante al de albicaudatus y recuerda tambien la carcajada de Geranoaëtus. En la vecindad de su vivienda se la oye gritar al acercarse alguien solamente, mientras que en el vuelo lo hace con mas frecuencia. Es tan fuerte el grito que puede oirse a considerable distancia y también cuando el ave se encuentra a gran altura. Son mas bien confiadas y permiten acercarse bastante al principio, pero despues de que una vez se las ha hecho fuego ya se hacen maliciosas y emprenden vuelo desde que divisan alguna persona a bastante distancia.