

3

BUTEO ALBICAUDATUS COLONUS Berlepsch

Reserva Universidad del Cauca

III - 1945

0356

Buteo albicaudatus colonus Berlepsch, Journ. f. Orn., 40, 1892, p. 91, (Isla de Curazao).

Buteo albicaudatus subsp. Todd-Carriker, Ann. Carnegie Mus., 14, p.150, 1922.

Buteo albicaudatus hypospodius Swann, Monogr. Bds. Prey, 1, pt.7, 1928, p.41; Rohl, Aves de Rapina Diurnas de Venezuela, 1933, p.55.

Buteo albicaudatus colonus Peters, Check-list, Bds. World, 1, 1931, p. 228; Fernández, Benedetti y Phelps, Las Aves de Margarita, 1940, p. 17 ; Barnés y Phelps, Las Aves de la Península de Paraguaná, 1940, p. 18 ; Gilliard, Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 77, 1941, p. 458.

Distribución: Peters da a esta raza la siguiente distribución: "Colombia, al oriente de los Andes, hasta Surinam; también las islas de Aruba, Bonaire, Curazao y Trinidad". Considero que esta es una raza restringida a la regiones áridas de la Costa Caribe desde la región de Santa Marta y la Guajira en Colombia, y por la costa de Venezuela y las islas antes citadas, posiblemente hasta un poco más al este. Es probable que la raza localizada más al interior, en los Llanos de Venezuela y Colombia y la Guayana, debe considerarse como diferente y así la trato en el presente trabajo a continuación.

Caractéres.- Menor que B. a. hypospodius, pero mayor que B. a. exiguus y de coloración cenicienta más clara en la cabeza y las partes superiores que este último; la garganta unas veces blanquecina y otras gris en los adultos. Largo total ♂ 457-465; ♀ 465-495; ♂ ala 402-410; ♀ 420; cola 150-165; tarso 85 mm. Mis ejemplares presentan una coloración cenicienta pizarra más clara que los de hypospodius y aún mas clara que la de exiguus que son los mas oscuros de los tres. Las partes inferiores son casi completamente blancas en ambos sexos, listados sobre los flancos con barras

angostas e irregulares café marrón; las tibias muy ligeramente listadas; las barras de la parte superior de la cola son incompletas y muy tenues.

Adulto. - Muy semejante al plumaje de la raza anterior, pero bastante más clara en general. Mr. W. H. Phelps sobre este punto ^{me escribe} así: "La cantidad de rojo en la parte de arriba varía en nuestros ejemplares; también varía el número de rayas de la cola." Este caracter también lo he observado yo y parece que disminuye en intensidad con la edad.

Jóven. - Es semejante a los jóvenes de hypospodius y de exiguus. Mr. Phelps me informa al referirse a ^eejemplares jóvenes de cuya identidad no está bien seguro: "16806 es negro (♀), con las bases de las plumas blancas. El centro del pecho es anteado. Los shanks son marrón barreteados de blanco. La cola es gris claro finamente barreteada con bandas de gris oscuro; "subterminal band" de negro de 1½ cms. de ancho; punta de la cola gris. No. 13330 es negro con rabadilla "scapulars", "lesser wing coverts", abdomen y "shanks" castaño. Sexo ?. El primer plumaje descrito por Mr. Phelps coincide perfectamente, pero el segundo se asemeja al plumaje intermedio de Buteo poecilocheus por la característica de los hombros, abdomen y tibias castaños, y Rohl, en su trabajo citado, describe un ejemplar hembra de Venezuela con esta misma fase de coloración, y lo atribuye a la raza típica B. a. albicaudatus. p.55.

Los únicos ejemplares que he visto de esta raza son diferentes de la de exiguus, o de hypospodius que hay en nuestras colecciones. Sin embargo es tan pequeña la diferencia, que puede ser variación individual o debida a la edad, que creo necesaria una revisión cuidadosa de la especie. Los ejemplares atribuidos a esta raza que existen en la colección del Instituto de Ciencias Naturales en Bogotá, fueron obtenidos por mí en la Guajir región de Maicao. 1 ♂ ad. abril 15. 1941 y 1 ♀ ad. abril 16. 1941. Durante ese mismo viaje en la Guajira el Dr. Alexander Wetmore y Mr. M. A. Carriger, Jr. lograron obtener dos ejemplares: una ^{hembra} Nazaret, mayo 1, 1941 y un macho en Santa Cruz, mayo 6, 1941. Sobre este particular el Dr

Wetmore me escribe desde Washington, febrero 27, 1942, "Both of these specimens have a wing measurement of 402 mm. and I have identified them as Buteo albicaudatus colonus, so that your supposition that they represent the same form as those you secured at Maicao is correct". Por esta razón considero que exiguus tratado a continuación es diferente, ya que comparado con los ejemplares guajiros es mucho más oscuro y de menor tamaño. Mas adelante dice el Dr. Wetmore: " In this connection I must call your attention to the fact that Kirke Swann is confused, in part, in the names that he uses for the races of this bird. According to Stresemann the race formerly called sennetti (Kirke Swann, Vol.1, page 418) is hypospodius. Stresemann has examined the type of this bird and finds that it is representative of the race that ranges from the mountains of Colombia through Central America to Texas. Likewise, according to Stresemann, the form listed by Kirke Swann as hypospodius (p.419) is to be known as Buteo albicaudatus colonus". De estos ejemplares también me informó Mr. M. A. Carriker en comunicación especial. Mr. W. H. Phelps en carta de diciembre 15, 1944, muy gentilmente me envía los datos siguientes: "albicaudatus colonus .- 498, ♀, Oct. 17-38 Moruy, Paraguaná, Edo. Falcon 110 m.; 2120 ♂ Marz. 16-39 Pedraza, Barinas, Edo. Barinas 310 m.; 5293 ♂ Dic. 16-39 Nirgua, Edo. Yaracuy 220 m.; 15792 ♀ Ene. 6-42 Palenque, Edo. Guarico; 15794 ♂ Ene. 15-42 La Paragua, Edo. Bolívar 280 m.; 16806 ♀ Mar. 5-42 Altiplanicie de Nuria, Sierra Imataca, Edo. Bolivar 460 m.; 13330 ? May. 15-41 Colonia Tevar, Edo. Aragua 1900 m.; 16808 ♀ Feb. 27-42 Altiplanicie Nuria, Srra. Imataca 430 m. Estos son los ejemplares obtenidos por él en Venezuela.

El 3 de abril de 1942 me escribe el Dr. Wetmore: " With further regard to Buteo albicaudatus, I find, in the specimens that Mr. Carriker secured for us, two skins from Terra Nueva in the Perijá Mountains at the upper end that are representative of the species hypospodius; one has the wing 450 mm. and the other 435 mm. These birds were taken

in July. At that season they could hardly be migrants. It would appear to me that the larger race may inhabit the mountains at the higher elevation, and the smaller race at the lowlands!.

Sobre esta especie los señores Todd y Barriker en su interesante libro sobre "Las Aves de la Región de Santa Marta, Colombia", 1922, p. 150, al referirse a los ejemplares obtenidos en dicha región dicen: "Cuatro formas de esta especie han sido descritas, y de ningún modo hemos podido esclarecer a cual de éstas pueden referirse los ejemplares de Santa Marta. La forma típica es del Paraguay; se dice que es un ave oscura, con la garganta plumiza, aún en individuos adultos. En la forma del norte sennetti (hoy hypoepodius), descrita del bajo Valle del Río Grande en Texas, las partes superiores son más claras, más grisosas o apizarradas, y la garganta blanca en el centro en los más viejos. Estas diferencias son evidentes en la pequeña serie que hemos estudiado, así como en la serie mucho mayor examinada por el Dr. Allen (Bulletin American Museum of Natural History, V, 1893, 142) y el Dr. Chapman (Ibidem, XXXIV, 1915, 637), pero si ellas son válidas falta probarse. Bien que, Salvin y Godman claramente expresan que no son válidos (Biología Centrali-Americana, Aves, III, 1900, 58), y su conclusión es digna de tenerse en cuenta. Además, la identidad de los ejemplares colombianos es dudosa. Tenemos un adulto del Occidente colombiano, que coincide en todos los aspectos con ejemplares de Texas, mientras el único ejemplar adulto de Bonda no se puede distinguir de otro de Bolivia. Estos dos ejemplares no pueden identificarse como exiguus recientemente descrito por el Dr. Chapman (l.c.) del oriente de Colombia y Venezuela a juzgar por la descripción. Si, no obstante, el ejemplar de Santa Marta se puede identificar con la forma del norte, y la última es válida (que en nuestra opinión es dudosa), el nombre de colonus de von Berlepsch (Journal für Ornithologie, XL, 1892, 91), basada sobre un ejemplar joven (oscuro) de Curazao, debería considerarse, puesto que es un nombre anterior para esta forma, en vez de ser aplicable únicamente a una raza insular co-

me suponía su autor." Como se deduce de lo anterior los señores Todd y Carriker, ya en 1922, pensaban que la raza de nuestra Costa Caribe era posiblemente colonus. Creo, como más arriba lo expreso, que esta raza habita las regiones semidesérticas de nuestra Costa Caribe, la Guajira, las costas de Venezuela y las islas próximas como lo demuestran los ejemplares obtenidos en todas esas regiones.

Debería hacerse una revisión cuidadosa de los ejemplares obtenidos en el interior de Venezuela y compararlos con los obtenidos en las costas para establecer definitivamente la identidad de estas formas.

Las costumbres de esta raza son iguales a las de sus congéneres como puede verse por lo que a continuación relato: el ejemplar q ad. que obtuve en Maicao lo maté pocos segundos después de haber capturado una pequeña culebra, la cual al preparar el ejemplar fué extraída del buche. El Dr. Wetmore la llevó a Washington para su identificación y de allá me escribe: (junio 25, 1941) " Do you remember the snake that came from the crop of one of your hawks ? This proves to be the first record for this species so far south. The animal is one that is known from Mexico and Central America. Hawks apparently are better collectors than humans " y después el julio 22, 1941: " The snake taken from the crop of the hawk that you killed at Maicao has been identified by Mr. Hobart Smith who is here with us as Masticophis mentovarius. He recognizes it as the subspecies suborbitalis and tells me that the only other record for northern South America is for the vicinity of Caracas". Nosotros pudimos apreciar la capacidad visual de esta águila. El individuo que capturó la culebra se hallaba volando en círculos sobre la sabana cubierta de pajonal y matorrales a una altura aproximada de 300 a 400 metros. De repente cerró las alas y descendió como una flecha sobre el pajonal a una distancia de unos 100 metros de nosotros. Inmediatamente fui en su busca y logre matarla cuando ya volaba de nuevo. La culebra en ⁿmección tiene una coloración amarillo verdoso aceituna

do, que la disimula en su medio ambiente y por consiguiente, muy difícil de ver. El Sr. E. T. Gilliard en "The Birds of Mt. Auyan-tepui, Venezuela" 1941, p.458, escribe sobre esta especie: "Field Notes.- February 20, 1938: Nest built of dry sticks (each freshly broken and apparently recently taken from the crown of the forest) which ranged from one inch to two and a half feet in length. Together they formed a substantial nest two and a half feet wide and 18 inches deep. This structure was found in a small tree growing in a large savanna and it was about seven feet above the ground. The egg cavity was about the size of a soup dish.--"While examining the nest, two large hawks kept up a screaming vigil. They soared menacingly to windward and occasionally the darker of the two, the ♀, approached to within 100 yards. This bird which I shot was completely blue-gray while its mate had under wing-coverts, breast and rump, pure white. About half a mile distant in the same 1100-meter savanna I found an old nest of similar design. In it were found many feathers including those of various parrots and several primaries of Eurypyga helias helias".

Yo no estoy seguro si estos ejemplares citados por Mr. Gilliard corresponden a esta raza o quizá mas bien a la siguiente exiguus, por tratarse de ejemplares del interior de Venezuela. La descripción que hace Mr. Gilliard del plumaje melánico se parece a la coloración melánica de B. a. hypopedius que dejo descrita, del ejemplar observado en Boquerón.-

Durante el viaje a la Guajira en abril de 1941 y mientras viajábamos entre ^{Riohacha} ~~Manare~~ y ^{El Pajaro} ~~Maicao~~ en la parte posterior de un camión tuve ocasión de observar varios individuos de esta especie que se hallaban volando sobre las sabanas de esa comarca. ⁽¹⁾ El ejemplar macho cazado en la región de Maicao algunos días mas tarde se encontraba en el suelo comiéndose una langosta, también observé un ejemplar adulto el 30 de Abril, 1941 en la región de La Tigrera, arriba de Sta. Marta, Magdalena, que estaba percheda sobre un árbol y que no pude capturar.

(1) Los Indios Guajiros llaman esta especie Narúro-péi nombre que aplican también a otras águilas de tamaño mediano.