

0377 73

UNA NUEVA ADICION A LAS RAPACES DE COLOMBIA

F. C. Lehmann V.

LEUCOPTERNIS PRINCEPS ZIMMERI Friedmann

Al dar esta denominación al único ejemplar de esta rarísima águila que hasta el presente ha sido encontrado en Colombia, sigo al Dr. H. Friedmann, quien en el Volumen LII, enero 1935, de "THE AUK" separa dos razas dejando los individuos encontrados en Centro-América como especie tipo, y dando a los ejemplares del Ecuador un nuevo nombre.

El ejemplar que me ocupa pertenece a la colección del Museo del Instituto de "La Salle", en Bogotá. Fué obtenido en Contratación, Santander, en el alto Valle del Río Segamozo, por el Rdo. Hermano Nicéforo Ma. en el mes de julio de 1939. El Hno. Nicéforo muy gentilmente me envió este ejemplar para su identificación, permitiéndome hacer la presente publicación por lo cual le estoy muy agradecido.

Las características de coloración de este ejemplar se ajustan en un todo a las que da Swann en su obra "Monograph of the Birds of Prey", y parece que se trata de un ejemplar adulto. Esta misma coloración tenía un ejemplar posiblemente de esta misma especie obtenido por el Sr. von Sneider en el Chocó en 1940, que ví yo muy de carrera en Diciembre de ese mismo año. Ambos ejemplares son por su coloración completamente adultos.

A continuación doy las medidas comparativas de las dos razas de esta especie, según las da Friedmann al tratar esta forma; así como las del ejemplar en que se basa este trabajo:

Leucopternis princeps princeps. - Ala ♂ 364-367; ♀ 380-388; Cola ♂ 210-223; ♀ 225; Culmen sin cera ♂ 29,5-31 mm.; ♀ 32 mm.

Leucopternis princeps zimmeri. - Ala ♂ 350-352; ♀ 351-358; Cola ♂ 191; ♀ 201; Culmen sin cera ♂ 30,5-33 mm.; ♀ 29-30 mm.

Leucopternis p. zimmeri o ad. Largo total 555; ala 358; cola 201
Culmen sin cera 35; tarso 90 mm.

Lehmann

Bogotá, Junio 6/43