

BUTEO ALBONOTATUS ABBREVIATUS Cabanis

Buteo abbreviatus Cabanis, Schomburgk, Reisen in Britisch-Guiana, T. III, p. 739, 1848. (Alto Pomeroon, Guayana Inglesa)

Tachytiorchis albonotatus Kaup, Contr. Orn. p. 75, 1850.

Tachytiorchis albinotatus Bonaparte, Conspectus Generum Avium T. I, p. 17, 1850.

Buteo zonovercus Schl., P. Z. S. p. 130, 1858.

Buteo cabanisii Schl. Mus. P.-B. Buteones, p. 11, 1862.

Astur cabanisii Gray, Handl. Bds. I, p.30, 1869.

Tachytiorchis abbreviatus pt. Sharpe, Cat. Bds. Brit. Mus. I, p. 163, 1874.

Buteo abbreviatus Todd-Carriker, Ann. of the Carnegie Museum, Vol.XIV, p.150, Oct.1922. (Birds of Santa Marta Region Colombia).

Buteo albonotatus abbreviatus Swann, Monograph of the Birds of Prey, T. I, pt.VII, p. 408, 1928.

Buteo albonotatus abbreviatus Peters, Check List of the Birds of the World, T. I, p. 232, 1931.

Buteo albonotatus abbreviatus Röhl, Aves de Rapiña Diurnas de Venezuela, p. 54, 1933.

Distribución.- Islas de las Perlas, Norte de Sur-América, desde Panamá hasta Surinam, según Peters. Swann da además de las regiones citadas, Brasil, Perú y Bolivia.

Caractéres.- Ala ♂ 380-385 mm., un ejemplar ♂ ad. de La Morelia (Caquetá), tiene las siguientes dimensiones: largo total 485, ala 375, cola 210, tarso 63, culmen 26 mm. Como puede verse por estas medidas el ejemplar de La Morelia se acerca mucho a las dimensiones del ejemplar tipo de la Guayana Inglesa, que según Cabanis en la obra de Richard Schomburgk "Reisen in Britisch-Guiana" citado arriba, da las siguientes dimensiones: Largo total 1' 7-8", pico 1½", ala 1'3¼", cola 8¼", tarso 2 1/2".

Adulto.- Color general negro, sin matices cenicientos o apizarrados como en la especie albonotatus albonotatus, sobre la espalda y el pecho, sino mas bien dando visos metálicos de tinte verdoso, sobre todo en la parte de arriba de los lados de la nuca y las coberteras

supra-alares hasta las escapulares y algunas secundarias en el lado exterior. Las plumas de la nuca son notablemente blancas en la base, algunas plumas del pecho, los flancos y el abdomen presentan pequeñas manchitas blancas no muy notorias, las coberteras subcaudales están bordeadas en la punta con rojizo y blanco, mas notorio este último en las más largas, que llegan más abajo de la mitad de la cola. Los cachetes y la base de las plumas frontales blancas. Las cinco primeras rémiges matizadas de gris-ceniciento en el lado exterior por encima, las demás y las secundarias algo parduzcas. Las cuatro primeras rémiges recortadas en el lado interior, la 4a. la más larga, la 3a. y la 5a. iguales, la 2a. ligeramente más larga que la 6a. Lado inferior de las primarias y secundarias cenizo parduzco, notablemente listadas con siete u ocho bandas color pardo-negruzco, que aumentan en achura hacia la base presentando así esta parte del ala una coloración mas uniforme parda-obscura. Pequeñas coberteras infra-alares negras, las mas grandes parduzcas moteadas con gris-ceniciento. Cola por encima negra, ligeramente terminada en blanco-ceniciento y moreno, con una ancha banda central gris-cenicienta, más blanca en la pina interior de las plumas y restos de una segunda banda clara más angosta e irregular arriba de la banda central. Diríase que la cola por debajo es más bien blanco-ceniza, con una ancha banda negra subterminal y otras mas delgadas e irregulares hacia la base; la punta cenicienta de la cola por debajo es mas ancha que por encima. Tibias completamente negras. Cera amarillo-verdosa, patas amarillas, ojos castaños.

Como dice Schomburgk, este Buteo es un representante típico de su especie. La descripción del ejemplar tipo de la Guayana da a entender que se trata de un individuo joven, pues al describir la cola dice que es de color "blanco-sucio con líneas transversales negras".

Por lo que dicen todos los autores acerca de esta especie, se deduce que se trata de un ave bastante rara. En Colombia ha sido encontrado muy pocas veces. Los Sres. Todd y Carriker, Jr. en

B. albonotatus abbreviatus - 3 -

su estudio sobre las aves de la región de Santa Marta, anotan tres ejemplares coleccionados dos de ellos por Mr. Smith en Bonda, en el año de 1899 y uno de Mamatoco coleccionado por Mr. Carriker en 1913. Desde entonces hasta el presente no sé yo de otros records de esta especie en Colombia, aparte del ejemplar recientemente coleccionado en La Morelia por el Sr. K. v. Sneidern, en octubre de 1941, y que ahora pertenece a la colección del Instituto.

Los señores Todd y Carriker l.c. dicen: "Parece ser una especie rara aquí como en cualquiera otra parte de su área de dispersión". Schomburgk l.c. dice: "Durante mi viaje en la Guayana, solamente fué encontrado un ejemplar de esta bella rapaz en las selvas del alto Pomeroun. Parece que le gusta vivir únicamente en las selvas espesas. Construye su nido de chamizas y yerbas en árboles muy altos".

Yo creo que un Buteo observado por mí en el Río Vaupés en 1939, pertenecía a esta especie. Así mismo creo que una rapaz que observé volando sobre las colinas de la orilla del mar en la región de Pozos Colorados cerca de Gaira en la costa atlántica en abril de 1941, y que en un principio tomé por un Rostrhamus, al observarlo detenidamente con el antejo ví claramente que no tenía la base de la cola blanca, que es la característica del caracolero. Por su modo de volar semejante al de las gualas Cathartes, supongo que puede haber sido un Buteo de la forma que nos ocupa.

Sobre las costumbres de este Buteo es muy poco lo que se conoce debido a su rareza. Los hermanos Penard en su estudio sobre las Aves de la Guayana publicado en 1908, dicen que en Surinam esta forma pone solamente uno o dos huevos, los que parecen ser semejantes a los de la forma típica. Si las costumbres y género de vida de esta forma son semejantes a las de la forma típica, entonces su alimento debe consistir en peces que capturan al estilo del águila pescadora Pandion, la-

5
B. albonotatus abbreviatus - 4 -

gatos, sapos, pequeños mamíferos entre los cuales ratas y otros roedores, parece que muy raramente ataca a las aves.