

420-
195-
91-
27-

Buteo precilochrous ♂ ad. Fase blanca.

Loc. Rio Molino. Carr. a Puerco. ~~Oct.~~ Dic. 1936 - Lek. coll.
iris café oscuro - cera verdosa - patos amarillos - pico hornblu.
Cabeza, nuca, garganta, lados del pecho y mant
negro pizarra, en la última región salpicado de
rojo herrumbroso. Partes inferiores, tibias y coler-
teras subcaudales, blancas, ligeramente ^{listado} ~~negro~~
en los costados por líneas irregulares negras
salpicado de herrumbroso. Axilares blancas, notable-
mente listadas de negro y rojo herrumbroso.
Primarias y secundarias de un fondo gris cenizo y listadas
con 9-10 líneas mas oscuras y una banda final
más ancha del mismo color. grandes coelerteras
supra-alares semejantes en coloración a las secunda-
rias. Las medianas casi negras o negro pizarra
y las menores, hasta el borde del ala en los hom-
bras de color rojo ladrillo que se extiende a la
mayor parte de las escapulares, donde están listadas
transversalmente de negro, mientras las plumas
de los hombros tienen el centro (shaft) negro.
Rabadilla blanca listada transversalmente de herrum-
broso. coelerteras supra-caudales completamente blan-
cas. Cola por encima blanca, un poco cenicienta en
los lados externos de las plumas y listada transversal-
mente con 6-7 líneas irregulares de color pardo negro
con una ancha banda subterminal negra. Cola por
bajo absolutamente blanca con una banda negra
subterminal - Coelerteras infra-alares mayores blancas
deusamente listadas de café-negruzco. ^{Las medianas de v.}
~~completamente blancas~~

Color - 420- más largo - 32 casi igual - 52 primarias recortadas

42

Buteo poecliochrous ♀ ad. Fare negre

Loc. Palo Verde - Patia - Cauca. alt. 900. Jul. 1936

ala 465-70; cola 210; tarso 91 culmen 31—

pico horn blue-, cera amarillo sedosa, patas amarillos.
iris castaño obscuro. —

Cabeza, nuca, espalda, garganta, pecho y flancos
negro pizarra medio plumizo. — Tibias castaño ave-
llana tigradas en el lado exterior de negrozco
o pizarra. — Escapulares pizarra negro, las men-
res salpicadas de castaño avellana. — Primarias y
secundarias con fondo gris cenizo listadas transversal-
mente por 7-8- líneas más oscuras y una ancha
banda terminal del mismo color. — Colesteras
supra-alares mayores más oscuras y listadas
en la misma forma. — Colesteras menores castaño
avellana formando el hombro. — Rabo y cola bastante
blanca, pero notablemente salpicada de plumizo oscuro
o pizarra y listada de café negro. Colesteras supra-
caudales más blancas que la rabo y cola y salpicadas y
listadas en la misma forma. — Cola por encima blan-
cos los lados externos de las plumas ceniciento grises, atr-
vesada por 6-7 líneas irregulares café-negro. y una
banda subterminal negra. — Pecho, flancos y parte
alta del abdomen notablemente salpicada o lavada
de castaño avellana. Parte final del abdomen y coxis
castaño avellana salpicados de plumizo negro. —
Colesteras subcaudales blancas, listadas transver-
salmente con líneas irregulares café oscuro.
Cola por debajo blanca con la banda subtermi-
nal negra. — alas por debajo gris plateado notablemente
listadas 8-9- líneas oscuras y una ancha banda termi-

del mismo color. — Colesteras infra-alares mayores en pizarra avellana. —
primarias listadas de blancos y menores castaño avellana.