

Buteo polyosoma ♀ ad. Face blanca

F. alor. 3^a + larga; 2^a - 4^a - 5^a = 2^a - 3 primeras recortadas.

ala 400; cola 220; tarso 77; culmen 25;

iris castaño oscuro - cera amarilla. patas amarillas. - pies hornillos

Frete blanquecina estriada. - Coronilla gris ceniza aplomado
nuca superior igual a la coronilla. - lados de la cara,
barbilla, garganta, ^{lados del cuello} y pecho blanco puro. - auriculares
superiores cenicientos, inferiores blancos estriados del
mismo color. - Parte posterior de la nuca, mantle y parte
de las escapulares rojo ladrillo intenso, algunas plumas
con el centro y líneas axilares negras. - Escapulares
mayores gris ceniciento listados transversalmente de
pardo negro y ancha banda subterminal oscura. -
coberteras supra-alares gris ceniciento listados de
plumizo o pizarra oscuro, con un ligero margen final
blanquecino. - Secundarias de fondo gris ceniza lis-
tados con 6-7 líneas plumizas oscuras y una ancha
banda subterminal del mismo color, terminados por
un margen apical blanquecino. - Primarias igual
que las secundarias pero sin margen blanco al final
lados del pecho plumizo. - Rabanilla gris plumizo o
algo cenicienta. - coberteras supra-caudales superiores
blancos ceniciento notablemente pintados de plumizo
los inferiores blancos con 2-3 líneas irregulares
oscuras. Cola por encima blanca con rastros de líneas
transversales irregulares y oscuras en la pluma central
salpicada en los lados externos de las plumas laterales
cenicienta, atravesada por una ancha banda subtermi-
negra de 45 m.m. que se desvanece hacia la punta que es
blanquecina. - Partes inferiores blancas listados por
líneas irregulares más fuertes en los flancos, menos
en el centro y casi nulas en las tibias ⁽¹⁾ - coberteras subcan-

la última con una línea fina
y margen final más ancho que por encima.
blancos puros, y margen final más ancho que por encima.
y cola por debajo blancos puros, y margen final más ancho que por encima.

(1) lado inferior de las alas blanco plateado y es-
viciado, estectoras infra-alares blancas listas
por pocas líneas irregulares de color negro por-
queco. -

Quintana Roo. 10-1938

Buteo polyosoma ♂ ad. Face clara

Form. alar 3+; 2-4; 5-2; 3 primarias recortadas.-

iris castaños oscuro.- cera amarillos rojos.- patas amarillas.-
pico horn-blue.- ala 375; cola 201; tarso 85; culmen 24;

Cabeza y nuca gris cenizo con el centro de las plumas negro.- parte inf. nuc. y manto gris cenizo uniforme; escapulares ligeramente más oscuras, y listados transversalmente de plumizo.- hombros igual que el manto; esternas supra-alares igual a las escapulares, secundarias gris ceniza tramezadas por 6 líneas de color plumizo oscuro y banda ancha subterminal del mismo color y terminadas en punta blanca.- Primarias semejantes a secundaria, pero más oscuras y sin punta blanca.- Rabadilla gris ceniza. Cola por encima blanca con rastros de 5 líneas irregulares transversales en las plumas centrales, y con ancha banda subterminal negra de 35 mm. continuada por una sombra cenicienta y terminada en un borde blanco.- esternas supra-caudales blancas ligeramente listadas de plumizo. Lados de la cara, barba, garganta, pecho, parte superior abdomen⁽¹⁾ blancos puros; lados del pecho cenicientos; tibias y flancos blancos, listados de negro pardusco más intensamente en los flancos. abdomen blanco ligeramente listado de plumizo.- Lado inferior de las alas blancos plateados y cenicientos parduscos, las menores más blancos.- Cila por debajo blanca con banda subterminal negra y ancho margen final blanco.-

(1) y esternas subcaudales