

0393

Bubo virginianus nigerescens

F&S. 47

Peñablanca, Cauca, agosto 10 - 1938. Lema. col.

lt. 575; ala 377; cola 210; tarsos 77.
 Culmen 34 mm. Orijos 60 mm. Ojos amarillos; cera y patas grisáceas.

Cabeza y nuca café oscura moteada de blanco y amarillento, sobre la frente y de amarillento rojizo en la base de los oídos y la nuca. Discos faciales blanquecinos ligeramente salpicados de pardo y de antea do debajo de los ojos; Rodeados de un margen negro en su lado exterior lateral; barba blanca, bordeada de rojizo amarillento. Orijos ^{abundantes} ~~negros~~ moteados en su lado interno de amarillento blanquecinos. — Garganta blanca menos extendida que en B. v. electus. Pecho muy salpicado + manchado de café oscuro, y barreteado del mismo color. Región escapular café oscura finamente salpicada de amarillento blanquecino. — Las plumas exteriores con grandes picos blancos. Hombros café-oscuro ligeramente pintados de amarillento; grandes coverts alares café-oscuro pintados de grandes manchas blancas y estos finamente salpicados de café.

~~Secundaria y primaria~~ café oscuras atrave-
zadas por 5 bandas anchas blanqueci-
das en las ^{primera} y ^{segunda} y amarillentos en las
segundas y en ambos ~~casos~~ ^{extensamente}
salpicados de café. Esta café oscura a-
travada por 4 bandas anchas amarillentas
y salpicadas de café, terminada por un
ancho margen blanco. - Partes inferiores
blancas o lavadas ligeramente de amari-
llento, densamente barreteadas o listadas
de café oscuro. - Criso amarillento sin
barras y coxiteras subcandales blancas
barreteadas de café oscuro. - Tibias y tarsos
bien emplumados de color antecao amari-
llento y ligeramente salpicados de café.
Pies bien emplumados y de color blan-
quecino amarillento. - Alas por debajo
más claras que por encima, blanqueci-
nas barradas de café. - Codo por debajo
blanco atravesada por 3 bandas de
color café. - Esta es la raza más
oscura de la especie. Habita los
páramos del Ecuador y de la Cordi-
llera central de Colombia hasta el
(Nevado del Tolima? - R.V.S.)

Schmauer

De este hermoso rapar ^{he} encontrada
durante mi viaje en Guayana
solamente un ejemplar ~~en~~
en la selva virgen muy espesa del
alto Trombetton.

Parece que le gustan las selvas
espesas para vivir.

Le dice, que el construye su nido ^{de ramita}
como las otras especies sobre arboles
muy altos. de

Buteo albarotatus abbreviatus

Mundo de Schomburgk R. in Brit. J. (Cebu).

Coloración general negra

la cola mas clara con bandas transversales negras.

Las plumas de la nuca asi como las la mayor parte de las plumas pequeñas son blancas en la base y ademas con ~~mas o menos~~ manchas blancas mas o menos grandes que estan cubiertas por las puntas y los bordes oscuros de las plumas. y

Por lo regular solamente son visibles ~~para~~ cuando las plumas se separan, las barbas interiores de las (plumas) primarias (con exception de la mitad exterior) y de las plumas de la cola son blancas con bandas angostas transversales negras.

El pico y las uñas negras.

La cera y los pies son amarillos.

Largo total -

El Pico

Las alas

La cola

Los tarsos

El museo de Berlin tiene ^{también} un ejemplar de esta misma especie procedente de Mexico

Una comparación de esta especie con el ^{para} mi desconocido *B. Hardhami* enseñara que clase de parentesco existe entre ellos.