

24-6
0436

EL GALLINAZO

Coragyps atratus foetens (Lichtenstein)

Otros nombres: chulo, zamuro, galembó, chicora, cuervo etc.

El gallinazo es la más común de las Catártidas; su color general es negro intenso.

DESCRIPCION.- La envergadura del gallinazo varía de 1,33 m. a 1,40 m. su longitud es de 0,65 m. a 0,68 m. de los cuales 0,18 m. corresponden a la cola. El gallinazo tiene la cabeza y parte del cuello desnudos y la piel de estas partes de un color negro mate o gris-negruzco opaco, bastante arrugada especialmente a los lados del cuello y sembradas de cortas plumitas negras en forma de pelos, más abundantes en la región de la coronilla. Este género nunca tiene coloraciones vivas en la piel de la cabeza y el cuello. El pico es bastante largo, relativamente delgado y está cubierto por la cera hasta adelante de la nariz que está bastante adelante y es de forma alargada y sin tabique divisorio. La punta del pico es córnea y notablemente ganchuda, provista de bordes muy cortantes, la parte anterior de la mandíbula superior es notablemente levantada por lo que se nota una depresión en la mitad del pico que es en esta parte casi cuadrado. Las plumas avanzan más arriba de la nuca que en la garganta, siendo más bajas en los lados inferiores del cuello. Los ojos son muy vivos y de color castaño rojizo-oscuro. Las patas son grises negruzcas con tarsos bastante altos de $7\frac{1}{2}$ cms. de longitud cubiertas por escamas pequeñas, más grandes en la parte anterior que en la posterior. Los dedos son largos, siendo el del centro de unos 8 cms. mientras que los laterales de igual tamaño ambos, solo tienen 5 cms. El dedo posterior que solamente tiene 2 cms. está como en las dos especies anteriores situado un poco alto. Los dedos anteriores están reunidos en su base por una membrana igualmente desarrollada a ambos lados del medio. Las uñas son color de cuerno negro, poco curvadas y muy agudas. En general las patas del gallinazo tienen la misma forma que las del cóndor. El plumaje es de color uniforme, negro intenso, con brillo metálico verdoso o violeta. Las rémiges primarias tienen el raquis completamente blanco, así como las barbas por el lado inferior que son de un color blanco sucio, más extendido hacia la base y sobre las barbas del lado exterior; en el extremo estas plumas son de un café-negro mate en su lado inferior, mientras que en el lado superior son casi completamente negras en la punta y de color pardo mate, bastante claro hacia la base. Las 6 o 7 primeras rémiges son recortadas en ambos lados, la más larga es la cuarta, y la primera la más corta y casi del largo de la sexta, pero sin embargo no se nota una gran diferencia de longitud entre ellas por lo cual parece como cuadrada la punta del ala en el vuelo. La característica de las primarias blancuzcas es muy notoria aún en el vuelo por lo cual se reconoce en seguida aún a cierta distancia.

El gallinazo es un ave relativamente pesada, a pesar de tener una envergadura menor que la guala es bastante más pesada que ésta.

NIDO Y HUEVOS.— El gallinazo anida de preferencia en el suelo, sin construir un nido especial, debajo de un matorral o al pié de un tronco, algunas veces anidan en agujeros de los barrancos o en el saliente de alguna roca, también suelen anidar en los zarcos debajo de los tejados. Por lo general no hacen un nido cuidadoso, sino que se contentan con unas pocas chamizas para uniformar el piso cuando está desigual. Ponen de uno á tres huevos de coloración blanco verdoso, o blanco azulado, manchados de puntitos castaños o rojizos, más abundantes en el extremo más ancho. Los jóvenes nacen desnudos, pero no tarda en aparecer un plumón de color crema sucio, que se desarrolla rápidamente. Esta especie como la mayoría de las aves en nuestro país no tienen época fija para anidar y corresponden generalmente con el final de las lluvias de suerte que los pequeños nacen al comienzo de la estación seca.

El gallinazo habita toda la América tropical y subtropical desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de la Argentina, y desde la Isla de Chiloé al oeste, hasta el 40° de longitud en el Brasil. Existe otra subespecie *coragyps atratus* atratus que es la que ocupa el área septentrional de su dispersión desde Panamá al norte, aunque también se encuentra en Colombia. Se lo encuentra en todos los climas, pero es más frecuente en los climas cálidos, y muy escaso en los páramos; frecuenta las poblaciones y las vecindades de las casas de campo.

El gallinazo, es un ave muy útil en el campo y en las ciudades cuyos servicios sanitarios son deficientes, sin embargo en muchas regiones son perseguidos por creerlos portadores de muchas enfermedades, pero ultimamente se ha comprobado en los Estados Unidos que esto no es cierto.

En ciertas poblaciones de Colombia donde se aprovechan las aguas lluvias son destruidos por ensuciar los tejados o techos pero esto se evita mucho más efectivamente que matándolos, poniendo un alambre templado a unos 15 cms. de altura sobre las partes más altas de los techos y sobre las aristas que son las partes más frecuentemente empleadas como sitios de descanso por estas aves.

Por lo general estas aves son rara vez molestadas debido a sus servicios sanitarios y en algunas partes viven como aves domésticas, sin temor al hombre y apenas se mueven cuando uno pasa por su lado. Cuando hay una carroña se reúnen centenares de ellos y en poco tiempo dejan los huesos completamente limpios. Durante su comida pelean unos con otros y como generalmente ocurre que son las gualas las primeras en llegar donde hay un animal muerto, ellos las observan continuamente y las siguen, cuando ellas se dirigen a tierra. Pero como son aves más fuertes las auyentan en seguida.

Como todas las catártidas el gallinazo es un gran volador. Su vuelo es muy potente y sostenido. En los días claros vuelan desde muy temprano y solos o en bandadas se remontan a gran altura describiendo círculos, y gracias a su gran poder visual localizan su alimento, descendiendo vertiginosamente, algunas veces con las alas cerradas y produciendo un ruido particular. En los días lluviosos permanecen casi inactivos reunidos en sus dormitorios, y si están en el aire cuando se aproxima una lluvia en seguida bajan con gran rapidez y buscan un lugar donde reposar mientras pasa el chubasco.

Esta especie se distingue de la siguiente por su coloración más oscura su forma más robusta y la posición de las alas en vuelo que no es curvada, sino más bien con las puntas dirigidas hacia adelante, además porque las rémiges primarias son de coloración más clara apareciendo a primera vista como blancas. La cola es muy corta y como recortada, por lo cual cuando la tienen cerrada parece cuadrada. Al aletear lo hace con rapidez y unos tres a ocho aleteazos seguidos de una más o menos larga planeada, pero una vez a bastante altura vuelan durante horas enteras sin mover más que ligeramente las alas para adaptarlas a las condiciones de las corrientes de aire. El gallinazo es una de las pocas aves, sino la única de este Orden que come frutas. Yo los he visto reunirse en los árboles de aguacate en las épocas de cosecha y comer frutos hasta que no pueden volar.

Nunca ataca a otras aves para comerlas, pero sí acaban de matar a los animales enfermos o moribundos, cuando éstos no se pueden parar, sacándoles los ojos y picoteándolos alrededor del ano.

Su voz es un graznido gutural, que se oye a alguna distancia cuando juega o cuando pelea. Acostumbran a reunirse en gran número en ^{los} sitios elegidos para dormir y no es raro ver más 40 de ellos en un solo árbol. En cambio nunca anidan en colonias, sino por parejas y muy lejos un nido de otro. Anoto como dato curioso que en las regiones del Vaupés, nunca ví un ave de éstas, en cambio se las vé a lo largo del Caquetá, el Putumayo y el Amazonas.

Estas aves nunca llevan alimento a sus polluelos en el pico o las patas, sino que los alimentan por regurgitación.