

#2

Para Revista Univ. del Cauca

92

BUTEO ALBICAUDATUS HYPOSPODIUS Gurney III - 1965

0459

Buteo hyospodius Gurney, Ibis, pl. 3, 1876, p. 73. (Medellín, Colombia).

Buteo albicaudatus sennetti Allen, Bull. A. M. N. H., 5, 1893, p. 144; Swann, Monogr. Bds. Prey, 1, pt. 7, 1928, p. 418.

Buteo albicaudatus hyospodius Peters, Check-list, Bds. World, 1, 1931, p. 228; May, The Hawks of North America, 1935, p. 53; Bent, Life Histories of North American Birds of Prey, 1, 1937, p. 216; Phelps, Las Aves de Perijá, 1944, p. 281.

Distribución: Sudeste de los Estados Unidos, (Bajo Valle del Río Grande) hacia el sur a través de México y América Central hasta el noroeste de Sur America en los Andes de Colombia y Mérida, Venezuela (Peters, 1931). Otros dan solamente el occidente de Colombia como límite de su área de dispersión, sin mencionar Venezuela.

Yo he obtenido ejemplares de esta raza en los alrededores de Popayán, y he visto algunos otros de la región de El Tambo, Cauca al occidente de Popayán. Ultimamente se han obtenido ejemplares en San Francisco, norte del Departamento del Cauca, y en Boquerón, Río Sumapáz, Tolima; también Mr. M. A. Carriker, Jr. obtuvo dos ejemplares en Tierra Nueva, Sierra de Perijá, Departamento del Magdalena en 1941, sobre los cuales me informa el Dr. Wetmore en carta que cito al tratar la forma colonus, y Mr. W. H. Phelps, en su trabajo sobre Las Aves de Perijá, Venezuela, cita un ejemplar observado en esa comarca, pero duda de su identificación correcta. Yo creo que es ~~mx~~ ~~correcta~~ ya que en Tierra Nueva del lado colombiano de la Sierra de Perijá se obtuvieron ejemplares cuya identidad está comprobada por el Dr. Wetmore.

Caractéres. - Largo total φ 510; ala 440-458; cola 170; tarso 85; culmen 33,5 mm.; σ ala 412-418 mm; iris café oscuro; cera amarillo verdosa; patas amarillo cromo.

Adulto.- Partes de arriba gris azulado oscuro o apizarrado ceniciento, hombros y parte de las escapulares ferruginosos o rojizos; alas con rémiges negruscas; partes inferiores blancas ligeramente listadas con barras delgadas oscuras en los flancos y sobre las tibias; rabadilla y cola blancas, algunas veces ligeramente listadas suavemente con barras oscuras; la cola con una ancha banda subterminal negra, las barras más finas e irregulares que en B. a. albicaudatus. La hembra adulta es por lo general mas oscura y el color rojizo herrumbre de los hombros y escapulares mas extenso; coberteras superiores de la cola blancas ligeramente listadas, las inferiores completamente blancas garganta blanca o cenicienta. Los ejemplares (99) de San Francisco, Río Cauca y Boquerón, Río Sumapaz, tienen la cabeza, lados de la cara, garganta, nuca y espalda, pizarra ceniciento; escapulares mas oscuras y pintadas de rojizo ferruginoso, pero de menor extensión, aunque mas ancha que en ejemplares blancos de B. poecilochrous, y de coloración menos intensa que en esta especie. Parte inferior de la garganta, pecho y resto de las partes inferiores completamente blancas ligeramente listadas en los flancos y en las tibias con barras irregulares oscuras; lados del pecho igual que la cabeza pizarra ceniciento; cola blanca con ancha banda subterminal negra y listada transversalmente por angostas barras irregulares negruscas; cola por debajo completamente blanca con banda subterminal negra; rabadilla blanca listada con barras irregulares angostas de color pizarra oscuro y salpicadas del mismo color y parduzco. Coberteras supracaudales blancas y listadas en la misma forma que la rabadilla; coberteras subcaudales ~~completamente~~ blancas. Estos son individuos completamente adultos.

Todos estos ejemplares son de coloración más clara que los de exiguus que he tenido oportunidad de examinar (25 en total). También se diferencian de los de colonus de la Guajira por su mayor tamaño y por

ser algo más oscuros.

Adulto.-(fase oscura) Esta fase se caracteriza por una coloración gris clara o cenicienta plumosa uniforme por encima y por debajo, sin las zonas rojizas de los hombros, pero conservando la cola como en la fase normal. Esta coloración es menos frecuente; de cinco ejemplares observados al tiempo, en la región de Boquerón citada, solamente un macho adulto la tenía. (Noviembre 10 de 1944)

Joven.-Color general por encima negro, o café muy oscuro, coberteras superiores de la cola bordeadas de rojizo, las más largas blancas listadas de rojizo; las plumas centrales de la cola color pizarra, las demás café mate en el lado exterior y cenicientas en el lado interior, todas listadas transversalmente de café oscuro, pero sin notarse la banda más ancha subterminal; por debajo negro muy oscuro, al centro del pecho ocráceo o amarillento y notablemente pintado con negro; abdomen y tibias listados con anteado rojizo. Ciertos individuos jóvenes son más claros y más pintados por debajo y tienen las plumas del abdomen y las tibias listadas y marginadas de blanco en vez de anteado rojizo, al parecer esta fase es el plumaje del segundo año. Algunos individuos en el primer año son muy oscuros, pero en esta especie no hay un verdadero melanismo, sino que existen ejemplares con el pecho y el abdomen grises como en B. polyosomus en el estado adulto.

Esta raza ha sido considerada por algunos ornitólogos como una fase de B. a. colonus, y por otros como de B. a. exiguus. Considero que existe más afinidad entre B. a. colonus y B. a. hypospodius, que entre éstos y B. a. exiguus al cual considero más intimamente relacionado con B. a. bicaudatus. También fué considerado por el Dr. Stresemann como sinónimo de poecilochrous, pero él mismo reconoció pronto las diferencias que hay entre estas dos especies, en tamaño, fórmula alar y sobre la longitud de la cola que es más corta en la presente, por lo cual fué incluida en

grupo de albicaudatus.

En esta variedad como en todas las formas de albicaudatus, los individuos jóvenes presentan una coloración casi negra o muy oscura, mientras que en polyesoma, los jóvenes presentan plumajes mas pardos y con tintes rojizos en la parte de arriba y plumajes barreteados por debajo, caracteres estos que sirven para diferenciar las dos razas en ejemplares jóvenes, puesto que ambas especies tienen la misma fórmula alar.

En la plancha en colores del Mayor Allan Brooks publicada en "The Hawks of North America" está magistralmente representada esta raza en plumajes de adultos y joven, y allí se puede ver muy bien la característica mas notoria de esta forma que es la garganta blanca en ejemplares bien adultos. Sin embargo véase lo que sobre este detalle digo al tratar del B. a. exiguus, pues creo que es un caso de interés y posiblemente observado por otros en individuos de la presente forma o de colonus.

El habitat favorito de la presente forma en Colombia lo constituyen las lomas cubiertas de pajonal o matorrales en regiones semiáridas. Las veces que he tenido oportunidad de observarlos en la altiplanicie de Popayán, he visto que lo mismo frecuentan los potreros abiertos y los bosques, como las faldas escarpadas de las cordilleras, pero son más abundantes en las regiones de terreno quebrado y de clima cálido, donde puede verse planeando en grandes círculos a bastante altura, otras ^{veces} parado sobre los árboles secos o sobre cualquier eminencia del terreno o sobre alguna piedra atisvando su presa. Es muy conspicuo por su coloración que lo destaca a distancia por el contraste de su blanco pecho o la blanca cola sobre el firmamento o la vegetación. Al aproximarse alguien emprende un vuelo calmado aleteando lentamente, y algunas veces dejando oír su grito peculiar que remeda una carcajada semi humana interrumpida, como burlándose de quien quizo aproximarse demasiado.

El Sr. K. von Sneidern les ha visto llegar en pequeños grupos de tr

o cuatro, cuando en la época de verano queman las lomas de paja en la región del Tambo, para hacer presa sobre las alimañas que huyen del fuego, especialmente lagartos, culebras, ratones e insectos.

Al parecer los individuos observados a mediados de noviembre (1944) en la región de Boquerón estaban preparándose para anidar, pues una pareja de machos se trabaron en feroz lucha por una hembra de coloración normal. El macho de coloración oscura fué el vencedor y cuando el vencido emprendía la fuga la hembra lo atacó también. En dos días que permanecí observándolos no se volvió a presentar por esas comarcas el vencido. Se atacaron violentamente en el aire y agarrados por las patas llegaban casi hasta el suelo, entonces se soltaban para agarrarse nuevamente. Unas veces uno y otras el otro parecía ser el mas fuerte colocándose arriba. Mientras tanto la hembra observaba el combate desde alguna distancia describiendo grandes círculos al parecer poco interesada en lo que pasaba.

Los hábitos alimenticios de esta raza se parecen a los de la mayoría de los Buteos, siendo mas bien beneficios que nocivos, por incluir en su dieta reptiles, roedores, insectos y muy raramente aves. El ejemplar obtenido en Boquerón tenía en el buche una rata. (1)

Aunque la localidad tipo de esta forma es Medellín, esta águila no es muy abundante en Colombia. Los ejemplares cazados y observados en el Departamento del Cauca no pasan de 10 y generalmente se las encuentra únicamente como aves de paso o individuos solos muy de vez en cuando. En regiones más al norte parecen ser permanentes y los campesinos de la región de Boquerón me informaron que estas águilas tenían un nido en un árbol seco del otro lado del río, pero esto no lo pude comprobar personalmente.

(1) Un ejemplar que tuve por varios meses vivo y en libertad en un solar grande en compañía de otras rapaces mi día que estuvo ambreado más a un milano gris (*Icthyophaga plumbea*), con patitos de cartuchos, y se comió solamente la cabeza.