

0463

Laguna de Suro

C.V.C

lista actualizada de. Aves y
Mamíferos.

Cali Dic. 5/72.

LISTA DE VERTEBRADOS (AVES Y MAMIFEROS) DE LA LAGUNA
DE SONSO, BUGA, VALLE Y SUS ALREDEDORES

Por: F. Carlos Lehmann V., Director
 del Museo Departamental de Historia
 Natural.-

La lista siguiente está basada en recolecciones y observaciones hechas en la Meseta del Valle desde 1.935 hasta 1.960, incluye especies nativas y migratorias de aves. Muchas de estas especies han desaparecido en los últimos años debido al cambio del medio ecológico en que se desarrollaron en la Meseta del Valle. Algunos si se reconstituye el habitat original de la Laguna y sus alrededores, podrían volver a establecerse espontaneamente, y otras podrían reintroducirse. Algunas, sin embargo, no pueden ser reintroducidas por necesitar espacios mayores o por inconveniencia. (Jaguar, danta, etc) y otras en cambio serian de urgente introducción (Lancha o Chigüiro, Pato Real, etc.).-

1ª AVES

- Orden: TINAMIFORMES
 Familia: Tinamidae - Gallinetas, Cuncunas, Panguanas.
Crypturellus soui caucae (Chapman) Gallineta chica del Cauca (T)
- Orden: COLYMBIFORMES
 Familia: Podicipedidae - Somorgujos, Zambullidores, etc.
Podiceps dominicus speciosus (Lynch-Arribáizaga) Zambullidor de pico corto (A).
Podilymbus podiceps antarcticus (Lesson) Zambullidor de Pico listado (A).
- Orden: PELECANIFORMES
 Familia: Phalacrocoracidae - Cormoranes, Guervos Marinos
Phalacrocorax olivaceus olivaceus (Gmlin) Cormorán Común.
 Guervo. (A) Mig.
- Familia: Anhingidae - Patos agujos.
Anhinga anhinga leucogaster (Vieillot) Pato Aguja (A)
- Orden: CICONIIFORMES
 Familia: Ardeidae - Garzas, Garzones, Guacos.
Ardea herodias herodias Garzón Azul (Mig.) (A).
Ardea coccy Linneo Garzón Azul (A)
Butorides virescens virescens (Linneo) Garcita verde (Mig.) (A)
Butorides striatus striatus (Linneo) Garcita verde (A)
Florida caerulea caerulea (Linneo) Garza Azul (Mig.) (A)

Orden:

CICONIIFORMES

Bubulcus ibis ibis (Linneo)Casmerodius albus egretta (Gmelin)Leucophoyx thula thula (Molina)Nycticorax nycticorax hoactly (Gmelin)Ixobrychus exilis erythromelasBotaurus pinnatus (Wagler)

Garcita de ganado (T) estab.

Garza Común (A).

Garza Nivea (A).

Garza Nocturna-Guaco (A).

Garcita enana (A).

Garza tigre (A).

Familia:

Ciconiidae - Cigüeñas-Cabeza de HuesoMycteria americana (Linneo)

Cabeza de Hueso (A).

Familia:

Threskiornithidae - Ibises, Garacoleros, Coro-coros, coclís, cucharas.Theristicus caudatus caudatus

Ibis de cuello anteado o coclí (T).

Phimosus infuscatus berlepschi (Hellmayr)

Ibis negro, Garacolero. (A. y T.)

Ajaia ajaja (Linneo)

Garza pico de cuchara, Garza Rosada

Orden:

ANSERIFORMES

Familia:

Anhimidae - Animas, Chaumas, Camucos etc.Anhima cornuta (Linneo)

Camuco, Buitre de Ciénaga (A).

Familia:

Anatidae - Patos, Gansos y Cisnes, Iguazas.Dendrocygna autumnalis discolor (Scal. & Salv.) Iguaza Mareña (A)

Iguaza María. (A).

Dendrocygna bicolor (Vieillot)

Iguaza careta, Pato viuda (A) Mig.

Dendrocygna viduata (Linneo)

Pato Rabo-de-Gallo (A) Mig.

Anas acuta (Linneo)

Pato silbador. (A) Mig.

Anas Americana (Gmelin)

Cerceta Careta, Zarceta (A) Mig.

Anas discors (Linneo)

Cerceta Roja, Zarceta (A)

Anas cyanoptera tropicus (Sny. & Ians)

Pato Cucharo (A) Mig.

Anas clypeata (Linneo)

Pato Marino, Cerceta Negra (A) Mig.

Netta erythrophthalma (Wied)

Pato Cabezudo Menor (A) Mig.

Aythya affinis (Eyton)Sarkidiornis melanotos sylvatica

(Ther & Thering)

Pato Brasileiro (A) Mig.

Cairina moschata (Linneo)

Pato Real, Pato Negro (A).

Oxyura dominica (Linneo)

Pato de Antifaz, Pato rojo (A).

Orden:

FALCONIFORMES

Familia:

Cathartidae - Condor, Gallinazo, Gualas.Sarcorampus papa (Linneo)

Rey de los Gallinazos (extinguido) (T).

Coragyps atratus brasiliensis (Bechstein)

Gallinazo, Chulo (T).

Cathartes aura jeta (Molina).

Guala de cabeza roja (T).

Cathartes burrovianus burrovianus (Cassin)

Guala de cabeza amarilla (T).

Familia: Accipitridae - Aguilas, Gavilanes, Milanos.-

<u>Elanus leucurus leucurus</u> (Vieillot)	Milano de cola blanca.	(T).
<u>Ictinia plumbea</u> (Gmelin)	Milano Gris.	(T).
<u>Heterospizias meridionalis meridionalis</u>	Aguila Roja	(T).
<u>Buteo albicaudatus hyospodius</u> (Gurney)	Aguila de cola blanca.	(T).
<u>Buteo magnirostris ecuadoriensis</u> (Swann)	Aguila Caminera	(T).
<u>Parabuteo unicinctus harrisi</u> (Audubon)	Aguila Alicastafia	(T).
<u>Buteo gallus urubitinga urubitinga</u> (Gmelin)	Aguila Negra (extinguida)	(T).
<u>Circus buffoni</u> (Gmelin)	Aguila pantanera	(T).

Familia: Pandionidae - Aguilas pescadoras

<u>Pandion haliaetus carolinensis</u> (Gmelin)	Aguila Pescadora	(T) Mig.
--	------------------	----------

Familia: Falconidae - Caracaras, Garrapateros, Halcónes, Cernícalos etc.

<u>Herpetoteres cachimans cachimans</u> (Linneo)	Gualdibia, Halcón culebrero	(T).
<u>Milvago chimachima cordatus</u> (Bangs & Penard)	Garrapatero, Halcón garrapatero.	(T).
<u>Polyborus plancus cheriway</u> (Jacquin)	Caracara, Guaraguao	(A).
<u>Falco peregrinus anatum</u> (Bonaparte)	Halcón Patero (escaso)	(T) Mig.
<u>Falco ruficularis petoensis</u> (Gibbs)	Halcón Caza Murciélagos	(T).
<u>Falco femoralis sbsp.</u>	Halcón Perdicero, H. Aplomado	(T).
<u>Falco columbarius columbarius</u> (Linneo)	Halcón Palomero, Esmerejón	(T). Mig.
<u>Falco sparverius caucae</u> (Chapman)	Cernícalo, Halcón común.	(T).

Orden: GALLIFORMES

Familia: Gracidae - Pavas, Pavas y Guacharacas.

<u>Penelope perspicax</u> (Bangs)	Pava Colorada (extinguida)	(T).
<u>Ortalis guttata caucae</u> (Chapman)	Guacharaca	(T).

Familia: Phasianidae - Codornices y Perdices

<u>Colinus cristatus badius</u> (Conover)	Codorniz, Perdiz	(T).
---	------------------	------

Orden: GRUIFORMES

Familia: Rallidae - Pollas y Gallinetas de agua, Chilacoas.

<u>Rallus nigricans caucae</u> (Schauensee)	Chilacoa Negra	(A)
<u>Aramides cajanea cajanea</u> (Miller)	Chilacoa de Bosque	(A)
<u>Porzana carolina</u> (Linneo)	Sora (rara)	(A) Mig.
<u>Porzana f. flaviventer</u> (Boddaert)	Polla de pecho amarillo	(A)
<u>Laterallus exilis</u> (Temminck)	Chilacoa pequeña (rara)	(A)
<u>Laterallus melanophaius albigularis</u> (Lawr)	Chilacoa de Garganta blanca	(A)
<u>Gallinula chloropus pauxilla</u> (Bangs)	Polla de agua común	(A)

Porphyryla martinica (Linneo)

Polla de agua azul (A) Mig.

Fulica americana sbsp

Polla de Agua grande, Gallineta. (A) Mig.

Familia: HeliornithidaeHeliornis fulica (Boddaert)

Zambullidor del Sol (raro) (A).

Orden: CHARADRIIFORMESFamilia: Jacanidae - Gallitos de Ciénaga.Jacana jacana melanopygia (Selater)

Gallito de Ciénaga (A).

Familia: Charadriidae - Ghorlos y Pellares.Vanellus chilensis cayennensis (Gmelin)

Pellar, alcayarán, anguilla (T).

Pluvialis d. dominica (Miller)

Ghorlo dorado americano (T) Mig.

Charadrius collaris (Vieillot)

Ghorlo collarejo (T) Mig.

Charadrius v. vociferus (Linneo)

Kildeer, Ghorlo Chillón (T) Mig.

Familia: Scolopacidae - Ghorlos, Becadas, Caicas.Tringa flavipes (Gmelin)

Ghorlo patiamarillo chico (A) Mig.

Tringa melanoleuca (Gmelin)

Ghorlo patiamarillo grande (A) Mig.

Tringa solitaria solitaria (Wilson)

Ghorlito Solitario (A) Mig.

Actitis macularia (Linneo)

Ghorlito Pintado. (A) Mig.

Limodromus griseus sbsp

Caica Gris (ocasional) (A) Mig.

Gallinago delicata (Ord)

Becada chica, caica (A) Mig.

Calidris alba (Pallas)

Ghorlito blanco (Ocasional) (A) Mig.

Calidris minutilla (Vieillot)

Ghorlito enano (A) Mig.

Calidris melanotos (Vieillot)

Ghorlo pintado (A) Mig.

Tryngites subruficollis (Vieillot)

Ghorlito común (T) Mig.

Familia: Recurvirostridae - Avocetas, Zancudas.Himantopus mexicanus (Müller)

Zancuda, Alcaldito (A) Mig.

Familia: Laridae - Gaviotas y Golondrinas acuáticas.Phaetusa s. simplex (Gmelin)

Golondrina de río (A)

Orden: COLUMBIFORMESFamilia: Columbidae - Torcazas y Palomas.Columba cayennensis tamboensis (Conover)

Torcaza morada (T).

Zenaida auriculata caucae (Chapman)

Paloma Nagüi-blanca (T).

Columbina passerina nama (Todd)

Tortolita gris (T).

Columbina talpacoti caucae (Chapman)

Abuelita (T).

Claravis pretiosa (Ferrari-Pérez)

Tórtola azul (T).

Leptotila verreauxi decolor (Salvin)

Paloma Fifi (T).

Leptotila pl. plumbeiceps (Selater & Salvin)

Paloma Pechi-blanca (T).

Orden:

PSITTACIFORMES

Familia:

Psittacidae - Loros, Pericos, etc.Ara severa castaneifrons (Lafresnaye)

Guacamaya Cari-Sucia. (T).

Aratinga w. wagleri (Grey)

Catalnica, Perico. (T).

Forpus conspicillatus caucae (Chapman)

Periquito, Cascabelito (T).

Pionus menstruus rubrigularis (Cabanis)

Loro- Mocho de cabeza azul (T).

Orden:

CUCULIFORMES

Familia:

Cuculidae - Cucús, Chamones, etc.Coccyzus pumilus (Strickland)

Cuco enano (T)

Coccyzus erythrophthalmus (Wilson)

Cuco de pico negro (T) Mig.

Coccyzus americanus americanus (Linneo)

Cuco de pico amarillo (T) Mig.

Coccyzus melacoryphus (Vieillot)

Cuco común (T).

Playa cayana nigriorissa (Cabanis)

Cuco ardilla común (T).

Playa minuta gracilis (Heine)

Cuco ardilla chico. (T).

Crotophaga major (Gmelin)

Chamón azul grande (raro) (T).

Crotophaga ani (Linneo)

Chamón negro común (T).

Tapera naevia naevia (Linneo)

Tres-piés, Tin-tin. (T).

Orden:

STRIGIFORMES

Familia:

Tytonidae - LechuzasTyto alba contempta (Hartert)

Lechuza común (T).

Familia:

Strigidae - BujosOtus choliba luctuosus (Bangs & Penard)

Morrocoy, Currucú (T).

Pulsatrix perspicillata ecuadoriana (Kelso)

Bujo de Anteojes (T).

Ciccaba nigrolineata (Selater)

Bujo listado (T).

Orden:

CAPRIMULGIFORMES

Familia:

Nyctibiidae - Perico-ligeroNyctibus griseus panamensis (Ridgway)

Perico - ligero (T).

Familia:

Caprimulgidae - Ghotacabras, Dormilones, Bujíos etc.

Chordeiles acutipennis Sbsp.

Dormilón

(T) Mig.

Chordeiles minor Sbsp.

Dormilón

(T) Mig.

Nyctidromus a. albicollis

Dormilón, Bujío, Judío

(T).

Orden: APODIFORMES

Familia: Apodidae - Vencejos.Streptoprogne zonaris albicincta (Cabanis)

Vencejo de Collar

(T).

Chaetura cinereiventris occidentalis (Berl & Tacz)

Vencejo cenizo

(T).

Chaetura spinicauda aetherodroma (Wetmore)

Vencejo Panameño

(T).

Cypseloides rutilus brunnitorques (Jafr)

Vencejo de collar rojo

(T).

Familia: Trochilidae - Colibríes, Chupa-flores, Tominejos, Esmeraldas etc.Glaucois hirsuta affinis (Lawrence)

Colibrí platanero

(T).

Florisuga mellivora (Linneo)

Colibrí collar rojo

(T).

Colibrí delphinae (Lesson)

Colibrí de orejas violetas

(T).

Anthracothorax n. nigricollis (Vieillot)

Colibrí de garganta negra

(T).

Chrysolampis mosquitos (Linneo)

Colibrí cabeza de rubí

(T).

Chlorostilbon mellisugus pumilus (Gould)

Colibrí esmeralda

(T).

Thalurania furcata subtropicalis (Griscom)

Colibrí azul

(T).

Hylacharis grayi grayi (Delatr. & Bourc)

Colibrí de cabeza azul

(T).

Amazilia saucerrottei s. (Delatr. & Bourc)

Colibrí pico rojo

(T).

Amazilia tzacatl sbsp.

Colibrí cola avellana.

(T).

Chalybura buffoni micans (Bangs & Barb.)

Colibrí brillante.

(T).

Heliomaster l. longirostris (Aud. & Vieill.)

Colibrí pico largo

(T).

Orden: CORACIIFORMES

Familia: Alcedinidae - Martines pescadores.Ceryle torquata torquata (Linneo)

Martín Pescador Collar rojo

(T).

Chloroceryle a. amazona (Latham).

Martín Pescador azul

(T).

Chloroceryle a. americana (Gmelin)

Martín Pescador verde

(T).

Chloroceryle inda (Linneo)

Martín Pescador chico

(T).

Orden: PICIFORMES

Familia: Picidae - Pájaros CarpinterosChrysomitris parvifrons strigularis (Chapman)

Carpintero Rayado

(T).

<u>Dryocopus lineatus nuperus</u> (Peters)	Carpintero Real Listado (T).
<u>Phloeosceastes melanoleucus malherbii</u>	Carpintero Real blanquinegro (T).
<u>Veniliornis f. fumigatus</u> (D'Orb. & Lafr.)	Carpintero ahumado (T).
<u>Veniliornis kirkii ceciliai</u> (Malh.)	Carpintero amarillento (T).
<u>Picumnus granadensis</u> (Lafresnay)	Carpintero enano. (T).

Orden: PASSERIFORMES

Familia:	<u>Dendrocolaptidae</u> - Trepa-palos, Carpinteros falsos.
	<u>Xiphorhynchus guttatus rosenbergi</u> (Bangs) Trepapalo
	<u>Lepidocolaptes souleyetti lineaticeps</u> (Lafr.) Trepapalo (T).

Familia:	<u>Fumariidae</u> - Homeros, Cola-espinas.
	<u>Synalaxis albescens insignis</u> (Zimmer) Pis-cui, Cutia (T).
	<u>Synalaxis brachyura caucae</u> (Chapman) Pis-cui del Valle (T).
	<u>Xenops minutus littoralis</u> (Selater) Pica-palo, pacifico (T).

Familia:	<u>Formicariidae</u> - Hormigueros.
	<u>Dysithamnus mentalis extremus</u> (Todd) Rastrojeros. (T).
	<u>Cercomacra tyrannina tyrannina</u> (Selater.) Hormiguero tirano (T).
	<u>Cercomacra nigricans atratus</u> (Todd) Hormiguero oscuro (T).
	<u>Formicarius analis saturatus</u> (Ridgway) Mirla hormiguera. (T).

Familia:	<u>Cotingidae</u> - Cotingas, Guervos Fruteros.
	<u>Pachyrhamphus rufus</u> (Bodd) Cotinga Cenicienta (T).
	<u>Pachyrhamphus polychopterus dorsalis</u> (Selater) Cotinga Pintada (T).

Familia:	<u>Pipridae</u> - Matracos
	<u>Manacus vitellinus viridiventris</u> (Grise.) Matraco verde (T).

Familia:	<u>Tyrannidae</u> - Papamoscas, Tiranos, Bicho-fusé, etc.
	<u>Fluvicola pica pica</u> (Bodd) Papamoscas acuático (T).
	<u>Pyrocephalus rubinus piurae</u> (Zimmer) Titiribí (T).
	<u>Muscivora tyrannus monachus</u> (Hartlaub) Tijereta (T).
	<u>Tyrannus tyrannus</u> (Linneo) Toreador blanco (T).
	<u>Tyrannus m. melancholicus</u> (Vieillot) Paparote, toreador. (T).
	<u>Myiodynastes maculatus difficilis</u> (Zimmer) Papa-moscas rayado (T).
	<u>Myiozetetes cayennensis hellmayri</u> (Hart & - Goods.) Pichancha (T).

<u>Pitangus sulphuratus caucensis</u> (Chapman)	Bicho-fué, Ben-te-vi	(T).
<u>Myiarchus crinitus</u> (Linneo)	Papa-moscas copetón	(T) Mig.
<u>Myiarchus apicalis</u> (Sclat. & Salv.)	Papa-moscas de cabeza negra	(T).
<u>Myiarchus tuberculifer brunneiceps</u> (Lawr.)	Papa-moscas de cabeza café	(T) Mig.
<u>Empidonax virescens</u> (Vieillot)	Papa-moscas de alas pintadas	(T) Mig.
<u>Tolmomyias sulfurescens asemus</u> (Bangs)	Papa-moscas de pico plano	(T).
<u>Todirostrum c. cinereum</u> (Linneo)	Patito	(T).
<u>Todirostrum sylvia superciliare</u> (Lawr.)	Patito de cejas	(T).
<u>Pogonotriccus c. ophthalmicus</u> (Taen.)	Papa-moscas bigotudo	(T).
<u>Elaenia f. flavogaster</u> (Thunberg.)	Elenia barriga-amarilla	(T).
<u>Phaenomyias murina inornata</u> (Cab. & Heine)	Papa-moscas ratón	(T).
<u>Camptostoma obsoletum caucae</u> (Chapman)	Papa-moscas valluno	(T).
<u>Tyranniscus c. chrysops</u> (Sclater)	Fico-fico	(T).

NOTA : Esta es una familia muy numerosa y difícil. Es posible que en la zona de este estudio se encuentren durante los meses de migraciones algunas otras especies migratorias no catalogadas aquí. También ocasionalmente algunas otras especies nativas de Sur-América.-

Orden: PASSERIFORMES

Familia: Hirundinidae - Golondrinas

<u>Progne c. chalybea</u> (Gmelin)	Golondrina	(T).
<u>Notiochelidon c. cyanoleuca</u> (Vieillot)	Golondrina azul y blanca	(T).
<u>Notiochelidon c. patagonica</u> (Lawr. & D'Orb)	Golondrina patagónica	(T).
<u>Stelgidopteryx ruficollis uropygialis</u> (Bangs)	Golondrina migratoria	(T).
<u>Hirundo rustica erythrogaster</u> (Boodart)	Golondrina de estable.	(T) Mig.

Familia: Troglodytidae - Cucaracheros.

<u>Troglodytes aedon striatulus</u> (Lawr.)	Cucarachero casero	(T).
---	--------------------	------

Familia: Mimidae - Miras blancas, Pájaros remedadores.

<u>Mimus gilvus tolimensis</u> (Ridgway)	Mirra blanca o común.	(T).
--	-----------------------	------

Familia: Turdidae - Tordos, Olleros, Miras negras, Chiguacos.

<u>Turdus ignobilis goodfellowi</u> (Hart. & Hellm.)	Olleros, Chiguaco	(T).
<u>Catharus ustulatus swainsoni</u> (T chudi)	Tordo espalda oliva	(T) Mig.

Familia: Vireonidae - Vireos.Vireo olivaceus caucae (Chapman)

Vireo caucano.

(T).

Hylophilus semi-brunneus (Lafresnaye)

Verderón cabeza café

(T).

Familia: Coerebidae - Meleros.Chlorophanes spiza subtropicalis (Todd.)

Melero azul-verde

(T).

Coereba flaveola caucae (Chapman)

Melero, Bananero Caucano

(T).

Familia: Parulidae - Cerrojillos.Mniotilta varia (Linneo)

Cerrojillo blanquinegro.

(T) Mig.

Parula pitiayumi elegans (Todd.)

Cerrojillo de espalda oliva

(T).

Dendroica petenhiesta aestiva (Gmelin)

Cerrojillo amarillo

(T) Mig.

Dendroica fusca (Miller)

Cerrojillo garganta naranja

(T) Mig.

Dendroica striata (Forster)

Cerrojillo listado

(T) Mig.

Seiurus noveboracensis sbsp

Tordo acuático

Mig.

Oporornis philadelphia (Wilson)

Cerrojillo cabeza negra

(T) Mig.

Wilsonia canadensis (Linneo)

Cerrojillo del Canadá

(T) Mig.

Setophaga ruticilla (Linneo)

Cerrojillo de cola roja

(T) Mig.

Basileuterus culicivorus occultus (Zimmer)

Cerrojillo antioqueño

(T).

Basileuterus coronatus regulus (Todd)

Cerrojillo coronado

(T).

Familia: Icteridae - Turpiales, Toches, Oropéndolas, etc.Psarocolius decumanus melanterus (Todd)

Rabi-amarillo negro

(T).

Scaphidura o. oryzivora (Gmelin)

Chamón come-maíz

(T).

Molothrus bonariensis cabanisii (Cassin)

Tordo Vaquero

(T).

Agelaius i. icterocephalus (Linneo)

Monjita, Tochesito de pantano

(T).

Ictes m. militaris (Linneo)

Alondra de pecho rojo

(T).

Familia: Thraupidae - Azulejos, Tangarás, Chisgas, etc.Euphonia saturata (Cabanis)

Chisga de corona naranja

(T).

Euphonia lanirostris crassirostris (Selater)

Chisga pico gordo

(T).

Tangara ruficapilla (Selater)

Chisga cabeza castaña

(T).

Thraupis episcopus cana (Swainson)

Azulejo común

(T).

Thraupis palmarum atripennis

Azulejo negro o palmero

(T).

Ramphocelus d. dimidiatus (Laf.)

Cardenal pico de plata

(T).

Ramphocelus flammigerus (Hard. & Selvy)

Asoma común

(T).

Piranga r. rubra (Linneo)

Cardenal

(T).

Tachyphonus rufus (Boddaert)

Asoma negra

(T).

<u>Hemithraupis guira guirina</u> (Sclater)	Tangara Guira	(T).
<u>Schistochlamys melanopsis aterrima</u>	Azulejo de cara negra	(T).
Familia: Fringillidae - Gorriónes, semilleros, etc.		
<u>Saltator albicollis striatipectus</u> (Lafr.)	Saltator rayado	(T).
<u>Cyanocompsa cyanea caucae</u> (Chapman)	Pico-gordo azul	(T).
<u>Tiaris olivacea dissita</u> (Thay. & Bens.)	Semillerito oliva	(T).
<u>Sporophila intermedia bogotensis</u> (Guilliard)	Semillero gris	(T).
<u>Sporophila n. nigricollis</u> (Vieillot)	Semillero peto-negro	(T).
<u>Sporophila m. minuta</u> (Idneo)	Semillero castaño	(T).
<u>Oryzoborus ^{ca}cassirostris occidentalis</u> (Sclater)	Arrocero Pico-gordo	(T).
<u>Volatinia jacarina splendens</u> (Vieillot)	Volantinero negro	(T).
<u>Myiospiza humeralis humeralis</u> (Bosc.)	Gorrión sabanero	(T).
<u>Ammodramus savannarum caucae</u> (Chapman)	Gorrión sabanero caucano	(T).
<u>Emberizoides herbicola sphenurus</u> (Vieillot)	Gorrión Coli-largo	(T).

La anterior lista comprende 18 ordenes, 50 familias y 221 formas entre especies y subespecies, de aves de la región que han sido capturadas, vistas o que se presume deben existir allí o pueden llegar a instalarse allí si se mejora el medio ambiente, ya que ninguna de las formas citadas ha sido capturada a más de 20 kilómetros en línea recta sobre la meseta del Valle, en un medio igual o muy semejante al existente en la laguna y sus alrededores, incluyendo el río Cauca y los pequeños bosques circundantes. Estos bosques deben aumentarse.

Es asombrosa la riqueza de la Avifauna de esa zona y es imperioso tratar de conservarla por todos los medios, mejorando el habitat, adquiriendo por medio de la CVC o alguna otra entidad una faja de terreno alrededor de la laguna y si posible una buena extensión entre la laguna y el río Cauca. Como puede apreciarse en la lista, es numerosa la variedad de especies migratorias que llegan allí, las formas acuáticas encontrarán allí el único refugio en muchos kilómetros, pues las obras de desecación están acabando con los pantanos de las mesetas del Valle y será altamente conveniente reservar otros santuarios tanto en el norte del departamento como en el sur, para asegurar así la conservación de la fauna autóctona y darle protección y alimento temporal a la migratoria.

Por tratarse de un Santuario reservado a la conservación de la fauna, no debe permitirse el uso de botes a motor en la laguna, los cuales ahuyentan las aves y hacen abandonar las polladas o los nidos. Los pescadores deben emplear cañas o remo o palanca.

Las letras (A) y (T) significan Acuática y Terrestre respectivamente, pero muchas especies catalogadas como terrestres, frecuentan lugares pantanosos en ocasiones y muchas más viven en los árboles sobre los cuales se alimentan con frutos, insectos, hojas, etc., También para nidificar. La abreviatura Mig. significa que la especie es migratoria.-

2º MAMÍFEROS

La lista siguiente de los mamíferos de la región de la laguna, es muy deficiente, pues este grupo no ha sido suficientemente estudiado en el Valle y carecemos de los datos sobre la existencia de muchas especies, particularmente en el grupo de los roedores que es muy numeroso y también en el de quirópteros. Incluye algunas especies que existieron hasta hace relativamente poco tiempo en esos lugares y que podrían ser replantados, pero no incluye especies como la Danta y el Tigre también desaparecidos, pero cuya replantación sería imposible e inaconsejable.-

Orden: MARSUPIALIA

Familia: Didelphidae - Chuchas o Zarigüeyas, Faras, Marmosas, etc.

Didelphis marsupialis sbsp.

Chucha común (T).

Marmosa caucae

Chuchita de platanar (T).

Caluromys derbianus sbsp

Chuchita lanuda (T).

Chironectes minimus

Chucha de agua (A).

Orden: CHIROPTERA

Familia: Desmodontidae - Vampiros o Murciélagos mordedores

Desmodus r. rotundus

Vampiro común

Diphylla ecaudata ?

Vampiro de doble escudo

Familia: Phyllostomidae - Falsos vampiros, Murciélagos de Lanza.

Phyllostomus hastatus caucae

Murciélago nariz de lanza .

Artibeus jamaicensis sbsp

Murciélago frutero.

Familia: Vespertilionidae - Murciélago de Membrana Peluda.

Familia: Molossidae - Murciélagos Cola de Ratón.

Eumops sp.

Murciélago orejudo.

Molossus crassicaudatus

Murciélago de cola ensanchada.

N

NOTA : La lista anterior de murciélagos se ha hecho siguiendo la distribución de D. Angel Cabrera, Mamíferos Suramericanos.-

Orden: PRIMATES

Familia: Cebidae - Monos, Micos, Martejas.

Alouatta seniculus

Mono Aullador Rojo (escaso).

Aotus trivirgatus lemurinus

Mono nocturno, marteja (escaso).

Orden: LAGOMORPHA

Familia: Leporidae - Conejos, liebres.

Sylvilagus brasiliensis sbsp.

Conejo común.

Orden: RODENTIA

Familia: Sciuridae - Ardillas.

Sciurus granatensis sbsp.

Ardilla común.

Familia: Muridae - Ratas y Ratones.

Oryzomys alfaroi

Ratón de campo.

Oryzomys caliginosus

Ratón de campo.

Oryzomys albigularis

Ratón de campo.

Rattus rattus

Rata común.

Familia: Hydrochoeridae - Capibaras, Iachas.

Hydrochoerus hydrochoeris

Iacha (Casi extinguida).

Familia: Dasyproctidae Guatines, Aguties.

Dasyprocta variegata sbsp.

Guatín (escaso).

Cuniculus paca sbsp.

Guagua (casi extinguida).

Orden: CARNIVORA

Familia: Canidae - Perros, Zorros, etc.

Cerdocyon thous sbsp.

Zorro o Lobito.

Familia: Mustelidae - Comadreja, Nutrias, Tairas.

Lutra sp.

Nutria (bastante escasa).

Mustela frenata sbsp.

Comadreja.

Galera barbara

Taira, Uland.

Familia: Felidae - Tigres, Tigrillos, Gatos.

Felis pardalis

Ocelote, Tigrillo real.

Felis concolor sbsp.

Puma (extinguido).

Felis onca

Tigre, Yaguar (extinguido).

Felis yagouaroundi

Gato-zorro (casi extinguido).

Orden: ARTIODACTYLA

Familia: Tayassuidae - Sainos, Tatabros, etc.

Tayassu pecari

Tatabro, Cafuche (Ext. en la zona).

Familia: Cervidae - Venados.

Mazama americana sbsp.

Venado bayo (extinguido).

NOTA :

En los últimos años ha habido cambios en la nomenclatura de algunas especies anotadas en la presente lista, que por la premura del tiempo no ha sido posible actualizar, pero que siempre es posible relacionar por medio de la sinonimia.-