

COPIA

TOMADO DEL ARCHIVO "VIDA SILVESTRE 1960-1961" DE SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL VALLE.

N°CRN-001

Sr. Dr.  
GUILLERMO BARNEY MATERON  
Secretario de Agricultura y Ganadería  
del Depto. del Valle  
E. S. D.

0682  
99  
Abril 15/60

Muy distinguido doctor y amigo:

A continuación tengo el gusto de detallar una lista de las especies animales tanto de aves como de mamíferos que se hallan positivamente, o que pueden hallarse ocasionalmente en la "Laguna de Sonso" ó "Laguna del Chircal", declarada como Santuario o refugio de aves migratorias en el Departamento. Incluye aves y animales acuáticos y terrestres. Laguna y alrededores.

1° - A V E S

Orden: TINAMIFORMES

Familia: Tinamidae - Gallinetas, Cuncunas, Panguanas.

Crypturellus soui cauae (Chapman) Gallineta Chica del Cauca (T)

Orden: COLYMBIFORMES

Familia: Clymbidae - Somorgujos, Zambullidores, etc.

Colymbus dominicus speciosus (Lynch-Arribálzaga) Zambullidor de pico corto (A).

Podilymbus podiceps antarcticus (Lesson) Zambullidor de Pico Listado (A).

ORDEN: PELEGANIFORMES

Familia: Phalacrocoracidae - Cormoranes, Cuervos Marinos.

Phalacrocorax brasilianus brasilianus (Gmelin) Cormorán Común. 4 Cuervo. (A). Mig.

Familia: Anhingidae - Patos agujos.

Anhinga anhinga leucogaster (Vieillot) Pato Aguja (A)

Orden: CICONIIFORMES

Familia: Ardeidae - Garzas. Garzones. Guacos.

Ardea herodias Garzón Azul (migratorio). (A).

Ardea cocoi Linneo Garzón Azul. (A).

Butorides virescens virescens (Linneo) Garcita verde (mig.) (A).

Butorides striatus striatus (Linneo) Garcita verde (A).

Florida caerulea caerulea (Linneo) Garza Azul (Mig.) (A).

Bubulcus ibis ibis (Linneo) Garcita del ganado (T) estab.

Casmerodius albus egretta (Gmelin) Garza Común (A).

Leucophoyx thula (Molina) Garza Nívea (A).

Nycticorax nycticorax hoactly (Gmelin) Garza Nocturna -Guaco (A)

Botaurus pinnatus (Wagler) Garza Tigre (A).

Leptochelys exilis sbsp. Garzita enana (A).

thula

Familia: Ciconiidae @ Cigüeñas- Cabeza de Hueso, Cabeza de Hueso (A).  
Mycteria americana Linneo

Familia: Threskiornithidae - Ibises, Caracoleros, Coro-coros, Golfes, Cu  
charas.

|                                                  |                                      |         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| <u>Theristicus caudatus caudatus</u> (Boddaert)  | Ibis de Guayana, Coclí.              | (T).    |
| <u>Phimosus infuscatus berlepschi</u> (Hellmayr) | Ibis Negro, Caracolero               | (A y T) |
| <u>Ajaia ajaia</u> (Linneo)                      | Garza pico de Cuchara, G.<br>Rosada. | (A)     |

Orden: ANSERIFORMES

Familia: Anhimidae - Animas, Chaunas, Camucos, etc.

|                                |                            |      |
|--------------------------------|----------------------------|------|
| <u>Anhima cornuta</u> (Linneo) | Camuco, Buitre de Ciénaga. | (A). |
|--------------------------------|----------------------------|------|

Familia: Anatidae - Patos, Gansos, y Cisnes, Iguazas.

|                                                           |                             |          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| <u>Dendrocygna autumnalis discolor</u> Sclat. & Salv.     | Iguaza Mareña.              | (A).     |
| <u>Dendrocygna bicolor</u> (Vieillot).                    | Iguaza María.               | (A).     |
| <u>Dendrocygna viduata</u> (Linneo).                      | Iguaza Careta, Pato viuda.  | (A) Mig. |
| <u>Anas Acuta</u> Linneo.                                 | Pato Rabo-de-Gallo.         | (A) Mig. |
| <u>Anas Americana</u> Gmelin                              | Pato Silbador.              | (A) Mig. |
| <u>Anas discors</u> Linneo.                               | Cerceta Careta, Zarceta.    | (A) "    |
| <u>Anas cyanoptera tropicus</u> Sny. & Luns.              | Cerceta Roja, Zarceta.      | (A)      |
| <u>Anas clypeata</u> Linneo.                              | Pato Cucharo.               | (A) Mig. |
| <u>Netta erythrophthalma</u> (Wied)                       | Pato Marino, Cerceta Negra. | (A) "    |
| <u>Aythya affinis</u> (Eyton)                             | Pato Cabezudo Menor         | (A) "    |
| <u>Sarkidiornis melanotos sylvicola</u> Iher &<br>Ihering | Pato Brasileiro             | (A) "    |
| <u>Cairina moschata</u> Linneo.                           | Pato Real, Pato Negro.      | (A)      |
| <u>Oxyura dominica</u> (Linneo).                          | Pato de Antifaz, Pato rojo  | (A)      |

Orden: FALCONIFORMES

Familia: Cathartidae - Condor, Gallinazo, Gualas.

|                                                 |                                          |     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|
| <u>Sarcorampus papa</u> (Linneo)                | Rey de los Gallinazos (ex-<br>tinguido). | (T) |
| <u>Coragyps atratus</u> (Bechstein)             | Gallinazo                                | (T) |
| <u>Cathartes aura</u> sbsp.                     | Guala de Cabeza roja.                    | (T) |
| <u>Cathartes burrovianus burrovianus</u> Cassin | Guala de cabeza amarilla.                | (T) |

Familia: Accipitridae - Aguilas, Gavilanes, Halcones, Caracaras.

|                                                 |                           |     |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-----|
| <u>Elanus leucurus leucurus</u> (Vieillot)      | Milano de Cola blanca.    | (T) |
| <u>Ictinia plumbea</u> (Gmelin)                 | Milano Gris.              | (T) |
| <u>Heterospizias meridionalis meridionalis</u>  | Aguila roja.              | (T) |
| <u>Buteo albicaudatus hyospodius</u> Gurney     | Aguila de cola blanca.    | (T) |
| <u>Buteo magnirostris ecuadoriensis</u> (Swann) | Gavilán Común.            | (T) |
| <u>Parabuteo unicinctus harrisi</u> (Audubon)   | Aguila Perdicera          | (T) |
| <u>Hypomorphnus u. urubitinga</u> (Gmelin)      | Aguila Negra (Extinguida) | (T) |
| <u>Circus brasiliensis</u> Gmelin               | Aguila Pantanera          | (T) |

Familia: Pandionidae - Aguilas Pescadoras.

|                                                |                   |          |
|------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <u>Pandion haliaetus carolinensis</u> (Gmelin) | Aguila Pescadora. | (T) Mig. |
|------------------------------------------------|-------------------|----------|

Familia: Falconidae - Garacaras, Garrapateros, Halcones, Cernícalo. Etc.

|                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <u>Herpetoteres cachinnas cachinnans</u> (Linneo) | Gualdibia, Halcón Culebrero (T)     |
| <u>Milvago Ghimachima cordatus</u> Bangs & Penard | Garrapatero, Halc. Garrapatero (T)  |
| <u>Caracara plancus cheriway</u> (Jacquin)        | Caracara, Guaraguao, Carraco (A)    |
| <u>Falco peregrinus anatum</u> Bonaparte          | Halcón Patero (escaso) (T) Mig.     |
| <u>Falco ruficularis petoensis</u> Chubb          | Halcón Gaza-Murciélagos (T)         |
| <u>Falco femoralis</u> sbsp.                      | Halcón Perdicero, H. Aplomado (T).  |
| <u>Falco c. columbarius</u> Linneo                | Halcón Palomero, Esmerejón (T) Mig. |
| <u>Falco sparverius caucæ</u> Chapman             | Cernícalo. (T)                      |

Orden: GALLIFORMES

Familia: Gracidae - Paujiles, Pavas y Guacharacas.

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| <u>Penelope perspicax</u> Bans       | Pava Colorada (Extinguida) (T) |
| <u>Ortalis guttata caucæ</u> Chapman | Guacharaca (T)                 |

Familia: Phasianidae - Codornices y Perdices

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <u>Colinus cristatus badius</u> Conover | Codorniz, Perdiz (T) |
|-----------------------------------------|----------------------|

Orden : GRUIFORMES

Familia: Rallidae - Pollas y Gallinetas de agua, Chilacoas.

|                                                    |                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <u>Rallus nigricans caucæ</u> de Schauensee        | Chilacoa Negra (A)                        |
| <u>Aramides cajanea cajanea</u> (Müller)           | Chilacoa de Bosque (A)                    |
| <u>Porzana carolina</u> (Linneo)                   | Sora (rara) (A) Mig.                      |
| <u>Porzana f. flaviventer</u> (Boddaert)           | Polla de pecho amarillo. (A)              |
| <u>Laterallus exilis</u> (Temminck)                | Chilacoa pequeña (rara) (A)               |
| <u>Laterallus melanophaius albigularis</u> (Lawr.) | Chilacoa de Garganta blanca (A)           |
| <u>Gallinula chloropus paxilla</u> Bangs           | Polla de Agua común. (A) Mig.             |
| <u>Porphyryla martinica</u> (Linneo)               | Polla de Agua Azul. (A) Mig.              |
| <u>Fulica americana</u> sbsp.                      | Polla de Agua Grande, Gallineta. (A) Mig. |

Familia : Heliornithidae - Zambullidor del sol. ( raro)

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| <u>Heliornis fulica</u> (Boddaert) | (A) |
|------------------------------------|-----|

Orden: CHARADRIIFORMES

Familia: Jacaniidae - Gallitos de Ciénaga.

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| <u>Jacana jamaa melanopygia</u> (Sclater) | Gallito de Ciénaga (A) |
|-------------------------------------------|------------------------|

Familia: Charadriidae - Chorlos y Pellar

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| <u>Belonopterus c. cayennensis</u> (Gmelin) | Pellar, Alcaraván. (T).           |
| <u>Pluvialis d. dominica</u> (Müller)       | Chorlo Dorado Americano (T) Mig.  |
| <u>Charadrius collaris</u> (Vieillot)       | Chorlo Collarejo (T) Mig.         |
| <u>Charadrius v. vociferus</u> (Linneo)     | Killdeer, Chorlo Chillón (T) Mig. |

Familia: Scolopacidae - Chorlos, Becadas, Caicas.

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <u>Totanus flavipes</u> (Gmelin)     | Chorlo Patiamarillo Chico (A) Mig.  |
| <u>Totanus melanoleucus</u> (Gmelin) | Chorlo Patiamarillo Grande (A) Mig. |
| <u>Tringa s. solitaria</u> (Wilson)  | Chorlito Solitario (A) Mig.         |
| <u>Actitis macularia</u> (Linneo)    | Chorlito Pintado (A) Mig.           |

Familia : Scolopacidae (cont)

|                                           |                           |         |
|-------------------------------------------|---------------------------|---------|
| <u>Limnodromus griseus</u> sbsp.          | Caica Gris (ocasional)    | (A)Mig. |
| <u>Capella gallinago delicata</u> (ord).  | Becada Chica              | (A)Mig. |
| <u>Grocethia alba</u> (Pallas)            | Chorlito blanco (Ocasinl) | (A)Mig. |
| <u>Erolia minutilla</u> (Vieillot)        | Chorlito enano            | (A)Mig. |
| <u>Erolia melanotos</u> (Vieillot)        | Chorlo pintado            | (A)Mig. |
| <u>Tryngites subruficollis</u> (Vieillot) | Chorlito común            | (T)Mig. |

Familia: Recurvirostridae - Avocetas, Zancudas.

|                                      |                     |         |
|--------------------------------------|---------------------|---------|
| <u>Himantopus mexicanus</u> (Müller) | Zancuda, Alcaldito. | (A)Mig. |
|--------------------------------------|---------------------|---------|

Familia: Laridae - Gaviotas y Golondrinas acuáticas.

|                                     |                    |      |
|-------------------------------------|--------------------|------|
| <u>Phaetusa s. simplex</u> (Gmelin) | Golondrina de Rio. | (A). |
|-------------------------------------|--------------------|------|

Orden : COLUMBIFORMES

Familia: Columbidae - Torcazas y Palomas.

|                                                    |                      |      |
|----------------------------------------------------|----------------------|------|
| <u>Columba cayennensis tamboensis</u> Conover      | (Torcaza Morada      | (T). |
| <u>Zenaida auriculata caucae</u> Chapman           | Paloma Nagüi-blanca. | (T)  |
| <u>Columbigallina passerina nana</u> (Todd)        | Tortolita gris.      | (T)  |
| <u>Columbigallina talpacoti caucae</u> (Chapman).  | Abuelita.            | (T)  |
| <u>Claravis pretiosa</u> (Ferrari-Pérez)           | Tórtola azul.        | (T)  |
| <u>Leptotila verreauxi decolor</u> (Salvin)        | Paloma Fiff          | (T)  |
| <u>Leptotila pl.plumbeiceps</u> (Sclater & Sanvin) | Paloma Pechi-blanca. | (T)  |

Orden: PSITTACIFORMES

Familia: Psittacidae - Loros, Pericos, etc.

|                                               |                           |      |
|-----------------------------------------------|---------------------------|------|
| <u>Ara severa castaneifrons</u> Lafresnay     | Guacamaya Cari-sucia      | (T)  |
| <u>Aratinga w. wagleri</u> (Gray)             | Catalnica, Perico         | (T)  |
| <u>Forpus conspicillatus caucae</u> (Chapman) | Periquito, Cascabelito    | (T). |
| <u>Pionus menstruus rubrigularis</u> Cabanis  | Loro-Mocho de cabeza azul | (T)  |

Orden: CUCULIFORMES

Familia : Cuculidae - Cucos - Chamones, etc.

|                                                |                           |         |
|------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| <u>Coccyzus pumilus</u> Strickland             | Guco Enano (raro)         | (T)     |
| <u>Coccyzus erythrophthalmus</u> (Wilson)      | Guco de pico negro.       | (T)Mig. |
| <u>Coccyzus americanus americanus</u> (Linneo) | Guco de pico amarillo     | (T)Mig. |
| <u>Coccyzus melacoryphus</u> Vieillot          | Guco común                | (T)     |
| <u>Playa cayana nigricrissa</u> (Cabanis)      | Guco Ardilla común        | (T)     |
| <u>Playa minuta gracilis</u> (Heine)           | Guco ardilla chico        | (T)     |
| <u>Crotophaga mayor</u> Gmelin                 | Chamón Azul grande (raro) | (T)     |
| <u>Crotophaga ani</u> Linneo                   | Chamón negro común        | (T)     |
| <u>Tapera naevia naevia</u> (Linneo)           | Tres-piés, Tintín         | (T)     |

Orden: STRIGIFORMES

Familia: Tytonidae - Lechuzas.

|                                      |                |     |
|--------------------------------------|----------------|-----|
| <u>Tyto Alba contempta</u> (Hartert) | Lechuza Común. | (T) |
|--------------------------------------|----------------|-----|

Familia: Strigidae - Buhos.

|                                                  |                   |     |
|--------------------------------------------------|-------------------|-----|
| <u>Otus choliba luctisonus</u> Bangs & Penard    | Morrocoy, Currucú | (T) |
| <u>Pulsatrix perspicillata ecuadoriana</u> Kelso | Buho de Anteojos  | (T) |
| <u>Ciccaba nigrolineata</u> Sclater              | Buho Listado      | (T) |

## Orden : CAPRIMULGIFORMES

Familia : Nyctibiidae - Perico-Ligero

Nyctibius griseus panamensis Ridgway Perico-Ligero (T).

Familia: Caprimulgidae - Chotacabras, Dormilones, Bujfos, etc.

Chordeiles acutipennis sbsp. Dormilón (T) Mig.  
Chordeiles minor sbsp. Dormilón (T) Mig.  
Nyctidromus a. albicollis (Gmelin) Dormilón, Bujfo, Judfo. (T).

## Orden: APODIFORMES

Familia: Apodidae - Vencejos,

Streptoprogne zonaris albicincta (Cabanis) Vencejo de Collar (T).  
Chaetura cinereiventris occidenta-  
lis. Berl. & Tacz. Vencejo cenizo. (T)  
Chaetura spinicauda aetherodroma Wetmore Vencejo Panameño. (T), Mig.  
Cypseloides rutilus brunneitor-  
ques (Lafr.) Vencejo de Collar rojo. (T)

Familia: Trochilidae - Colibríes, chupa-flores, Tominejos, Esmeraldas, etc.

Glaucis hirsuta affinis Lawrence Colibrí Platanero (T)  
Florisuga mellivora (Linneo) Colibrí Collarejo. (T)  
Colibri delphinae (Lesson) Colibrí de Orejas violetas (T)  
Anthracothonax n. nigricollis (Vieillot) Colibrí de Garganta negra (T)  
Chrysolampis mosquitus (Linneo) 8 Colibrí Cabeza de Rubí (T)  
Chlorostilbon gibsoni pumilus (Gould) Esmeraldita (T)  
Thalurania furcata subtropicalis Griscom Colibrí Azul (T)  
Hylocharis grayi grayi (Delatr. & Bourc) Colibrí de Cabeza azul. (T)  
Amazilia saucerrottei s. (Delatr. & Bourc) Colibrí Pico-Rojo (T)  
Amazilia tzacatl sbsp. Colibrí Cola-Avellana. (T)  
Chalybura buffoni micans Bangs & Barb. Colibrí Brillante (T)  
Helimaster l. longirostris Aud. & Vieill. Colibrí de Pico Largo. (T)

## Orden: CORACIIFORMES

Familia: Alcedinidae - Martínez Pescadores.

Ceryle torquata torquata (Linneo) Martín Pescador Collarejo (T)  
Chloroceryle a. amazona (Latham) Martín Pescador Azul (T)  
Chloroceryle a. americana (Gmelin) Martín Pescador Verde (T)  
Chloroceryle inda (Linneo) Martín Pescador Chico. (T)

## Orden : PICIFORMES

Familia Picidae - Pájaro Carpintero.

Chrysomitris punctigula striatigularis Chapman Carpintero Rayado. (T)  
Dryocopus lineatus nuperus (Peters) Carpintero Real Listado (T)  
Phloeoceastes melnoleucos malherbii Carpintero Real Blanquinegro (T)  
Veniliornis f. fumigatus (d'Orb. & Lafr.) Carpintero Ahumado (T)  
Veniliornis kirkii ceciliai (Malh.) Carpintero Amarillento (T)  
Picumnus granadensis Lafresnaye Carpintero Enano. (T)

Orden : PASSERIFORMES

Familia : Dendrocolaptidae - Trepa-Palos, Carpinteros Falsos.

|                                                      |            |     |
|------------------------------------------------------|------------|-----|
| <u>Xiphorhynchus guttatus rosenbergi</u> Bangs       | Trepa-Palo |     |
| <u>Lepidocolaptes souleyetti lineaticeps</u> (Lafr.) | Trepa-Palo | (T) |

Familia : Furnariidae - Horneros, Cola-espinas.

|                                      |         |                    |     |
|--------------------------------------|---------|--------------------|-----|
| <u>Synallaxis albescens insignis</u> | Zimmer  | Pis-cuf, Cutfa.    | (T) |
| <u>Synallaxis brachyura cauae</u>    | Chapman | Pis-cuf del Valle  | (T) |
| <u>Xenops minutus littoralis</u>     | Sclater | Pica-Palo Pacífico | (T) |

Familia : Formicariidae - Hormigueros.

|                                                |         |                   |     |
|------------------------------------------------|---------|-------------------|-----|
| <u>Dysithamnus mentalis extremus</u>           | Todd    | Rastrojero        | (T) |
| <u>Cercomacra tyrannina tyrannina</u> (Scater) |         | Hormiguero Tirano | (T) |
| <u>Cercomacra nigricans atratus</u>            | Todd    | Hormiguero oscuro | (T) |
| <u>Formicarius analis saturatus</u>            | Ridgway | Mirla hormiguera. | (T) |

Familia : Cotingidae - Cotingas, Curvos Fruteros.

|                                            |      |                    |     |
|--------------------------------------------|------|--------------------|-----|
| <u>Pachyramphus rufus</u> (Bodd)           |      | Cotinga Genicienta | (T) |
| <u>Pachyramphus polychopterus dorsalis</u> | Scl. | Cotinga Pintada.   | (T) |

Familia : Pipridae - Matracos.

|                                         |        |                |     |
|-----------------------------------------|--------|----------------|-----|
| <u>Manacus vitellinus viridiventris</u> | Grisc. | Matraco Verde. | (T) |
|-----------------------------------------|--------|----------------|-----|

Familia : Tyrannidae - Papamoscas, Tiranos, Bicho-fué, etc.

|                                                 |                |                              |          |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------|
| <u>Fluvicola pica pica</u> (Bood.)              |                | Papamoscas, acuático.        | (T)      |
| <u>Pyrocephalus rubinus piurae</u>              | Zimmer         | Titiribí.                    | (T)      |
| <u>Muscivora tyrannus monachus</u> (Hartlaub)   |                | Tijereta                     | (T)      |
| <u>Tyrannus tyrannus</u> (Linneo)               |                | Toreador blanco              | (T)      |
| <u>Tyrannus melancholicus melancholicus</u>     | Vieill         | Paparote, Toreador           | (T)      |
| <u>Myiodynastes maculatus difficilis</u>        | Zimmer         | Papa-Moscas rayado.          | (T)      |
| <u>Myiozetetes cayennensis hellmayri</u>        | Hart. & Goods. | Pichancha.                   | (T)      |
| <u>Pitangus sulphuratus caucensis</u>           | Chapman        | Bicho-fue, Bem-te-ví         | (T)      |
| <u>Myiarchus crinitus</u> (Linneo)              |                | Papa-moscaw copetón          | (T) Mig. |
| <u>Myiarchus apicalis</u>                       | Sclat. & Salv. | Papa-moscas de Cabeza negra  | (T).     |
| <u>Myiarchus tuberculifer bruneiceps</u>        | Lawr.          | Papa-moscas de cabeza café   | (T)      |
| <u>Empidonax virescens</u> (Vieill.)            |                | Papa-moscas de alas pintadas | (T) Mig. |
| <u>Telmomyias sulfurescens asemus</u> (Bangs)   |                | Papamoscas de pico plano     | (T)      |
| <u>Todirostrum c.cinereum</u> (Linneo)          |                | Patíco                       | (T)      |
| <u>Todirostrum sylvia superciliare</u>          | Lawr.          | Patíco de cejas              | (T)      |
| <u>Pogonotriccus ophthalmicus</u>               | Tacz.          | Papa-moscas bigotudo         | (T)      |
| <u>Elaenia f. flavogaster</u> (Thunberg)        |                | Elenia barriga-amarilla      | (T)      |
| <u>Phaeomyias murina incomta</u> (Cab. & Heine) |                | Papa-moscas Ratón.           | (T)      |
| <u>Campptostoma obsoletum cauae</u>             | Chapman.       | Papa-moscas Valluno          | (T)      |
| <u>Tyranniscus c. chrysops</u> (Sclater)        |                | Pfo- Fío.                    | (T)      |

**N O T A :** Esta es una familia muy numerosa y difícil. Es posible que en la zona de este estudio se encuentren durante los meses de migraciones, algunas otras especies migratorias no catalogadas aquí. También ocasionalmente algunas otras especies nativas de Sur América.-

## Orden : PASSERIFORMES (cont).

Familia : Hirundinidae - Golondrinas.

|                                                                 |                          |          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| <u>Progne c. chalybea</u> (Gmelin)                              | Golondrina               | (T)      |
| <u>Pygochelidon c. cyanoleuca</u> (Vieill.)                     | Golondrina azul y blanca | (T)      |
| <u>Pygochelidon c. patagonica</u> (Lafr. & D <sup>o</sup> Orb.) | Golondrina Patagónica    | (T) Mig. |
| <u>Stelgidopteryx ruficollis aequalis</u> Bangs                 | Golondrina               | (T) Mig. |
| <u>Hirundo rustica erythrogaster</u> Boodaert                   | Golondrina de establo    | (T) Mig. |

Familia : Troglodytidae - Cucaracheros

|                                                |                    |     |
|------------------------------------------------|--------------------|-----|
| <u>Troglodytes musculus striatulus</u> (Lafr.) | Cucarachero Casero | (T) |
|------------------------------------------------|--------------------|-----|

Familia : Mimidae - Mirlas blancas, Pájaros remedadores.

|                                        |                      |     |
|----------------------------------------|----------------------|-----|
| <u>Mimus gilvus tolimensis</u> Ridgway | Mirra blanca o común | (T) |
|----------------------------------------|----------------------|-----|

Familia : Turdidae - Tordos, Olleros, Mirlas Negras, Chiguacos.

|                                                    |                     |          |
|----------------------------------------------------|---------------------|----------|
| <u>Turdus ignobilis goodfellowi</u> Hart. & Hellm. | Ollero. Chiguaco.   | (T).     |
| <u>Catharus ustulatus swainsoni</u> (Tschudi)      | Tordo espalda oliva | (T) Mig. |

Familia : Vireonidae Vireos

|                                            |                      |     |
|--------------------------------------------|----------------------|-----|
| <u>Vireo Olivaceus caucae</u> (Chapman)    | Vireo Caucano        | (T) |
| <u>Hylophilus semi-brunneus</u> Lafresnaye | Verderón Cabeza-café | (T) |

Familia : Coerebidae - Meleros

|                                                         |                          |     |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----|
| <u>Chlorophanes spiza s<sup>u</sup>btropicalis</u> Todd | Melero Azul-verde        | (T) |
| <u>Goereba flaveola caucae</u> Chapman                  | Melero, Bananero Caucano | (T) |

Familia : Parulidae - Cerrojillos.

|                                                 |                             |          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| <u>Mniotilta varia</u> (Linneo)                 | Cerrojillo Blanquinegro     | (T) Mig. |
| <u>Parula pitiayumi elegans</u> (Todd)          | Cerrojillo de Espalda oliva | (T)      |
| <u>Dendroica petechia aestiva</u> (Gmelin)      | Cerrojillo amarillo         | (T) Mig. |
| <u>Dendroica fusca</u> (Müller)                 | Cerrojillo Garganta naranja | (T) Mig. |
| <u>Dendroica striata</u> (Forster)              | Cerrojillo listado          | (T) Mig. |
| <u>Seiurus noveboracensis</u> sbsp.             | Tordo Acuático              | (T) Mig. |
| <u>Oporornis philadelphia</u> (Wilson)          | Cerrojillo Cabeza negra     | (T) Mig. |
| <u>Wilsonia canadensis</u> (Linneo)             | Cerrojillo del Canadá       | (T) Mig. |
| <u>Serophaga ruticilla</u> (Linneo)             | Cerrojillo de cola roja     | (T) Mih. |
| <u>Basileuterus culicivorus occultus</u> Zimmer | Cerrojillo antioqueño       | (T)      |
| <u>Basileuterus coronatus regulus</u> Todd      | Cerrojillo coronado         | (T)      |

Familia : Icteridae - Turpiales, Toches, Oropéndolas, etc.

|                                                  |                               |      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| <u>Psarocolius decumanus melanterus</u> (Todd)   | Rabi-amarillo Copetón         | (T)  |
| <u>Psomocolax oryzivorus oryzivorus</u> (Gmelin) | Chamón come-mafz.             | (T)  |
| <u>Molothrus bonariensis cabanisi</u> Cassin     | Tordo Vaquero                 | (T)  |
| <u>Agelaius i. icterocephalus</u> (Linneo)       | Monjita, Tochesito de Pantano | (T)  |
| <u>Leistes m. militaris</u> (Linneo)             | Alondra de Pecho rojo         | (T). |

## Orden : PASSERIFORMES (Cont).

Familia: Thraupidae - Azulejos, Tangaras, Chisgas, etc.

|                                                 |                          |          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| <u>Tanagra saturata</u> (Cabanis)               | Chisga Corona Naranja    | (T)      |
| <u>Tanagra lanirostris crassirostris</u> (Scl.) | Chisga Pico-gordo.       | (T)      |
| <u>Tangara ruficapilla</u> (Sclater)            | Chisga Cabeza castaña    | (T)      |
| <u>Thraupis virens cana</u> (Swainson)          | Azulejo común.           | (T)      |
| <u>Thraupis palmarum</u> sbsp.                  | Azulejo Negro o Palmero. | (T)      |
| <u>Ramphocelus d. dimidiatus</u> Lafr.          | Cardenal Pico-de-Plata.  | (T)      |
| <u>Ramphocelus flammigerus</u> (Hard.&Selvy)    | Asoma Común              | (T)      |
| <u>Piranga r. rubra</u> (Linneo)                | Cardenal                 | (T) Mig. |
| <u>Tachyphonus rufus</u> (Boddaert)             | Asoma Negra              | (T)      |
| <u>Hemithraupis guira guirina</u> (Scl.)        | Tangara Guira            | (T)      |
| <u>Schistochlamys melanopis aterrima</u>        | Azulejo de Cara Negra.   | (T)      |

Familia: Fringillidae - Gorriónes, Semilleros, etc.

|                                                    |                          |     |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-----|
| <u>Saltator albicollis striatipictus</u> Lafr.     | Saltator Rayado          | (T) |
| <u>Cyanocompsa cyanea caucae</u> Chapman           | Pico-gordo azul          | (T) |
| <u>Tiaris olivacea dissita</u> Thay. & Bans.       | Semillerito oliva        | (T) |
| <u>Spermophila intermedia bogotensis</u> Guilliard | Semillero Gris           | (T) |
| <u>Spermophila n. nigricollis</u> (Vieill.)        | Semillero Peto-negro     | (T) |
| <u>Spermophila m. minuta</u> (Linneo)              | Semillero Gastaño        | (T) |
| <u>Oryzoborus crassirostris occidentalis</u> Scl.  | Arrocero Pico-gordo      | (T) |
| <u>Volatinia jacarina splendens</u> (Vieill.)      | Volatinero Negro         | (T) |
| <u>Myiospiza humeralis humeralis</u> (Bosc)        | Gorrión Sabanero.        | (T) |
| <u>Ammodromus savannarum caucae</u> Chapman        | Gorrión Sabanero Caucano | (T) |
| <u>Emberizoides herbicola sphenurus</u> (Vieill.)  | Gorrión Coli-largo       | (T) |

La anterior lista comprende 18 ordenes, 50 Familias y 221 formas entre especies y subespecies, de aves de la región, que han sido capturadas, vistas o que se presume deben existir allí o pueden llegar a instalarse allí si se mejora el medio ambiente, ya que ninguna de las formas citadas ha sido capturada a mas de 20 kilómetros en línea recta sobre la meseta del Valle, en un medio igual o muy semejante al existente en la Laguna y sus alrededores, incluyendo el Rio Cauca y los pequeños bosques circundantes. Estos bosques deben aumentarse.-

Es asombrosa la riqueza de la Avifauna de esa zona y es imperioso tratar de conservarla por todos los medios, mejorando el habitat, adquiriendo por medio de la CVC o alguna otra entidad una faja de terreno alrededor de la Laguna y si posible una buena extensión entre la laguna y el Rio Cauca. Como puede apreciarse de la lista, es numerosa la variedad de especies migratorias que llegan allí. Las formas acuáticas encontrarán allí el único refugio en muchos kilómetros, pues las obras de desecación están acabando con los pantanos de la meseta del Valle y será altamente conveniente reservar otros santuarios tanto en el norte del Departamento como en el sur, para asegurar así la conservación de la fauna autóctona y darle protección y alimento temporal a la migratoria.-

Por tratarse de un Santuario reservado a conservación de la fauna, no debe permitirse el uso de botes a motor en la laguna, los cuales ahuyentan las aves

y hacen abandonar las polladas o los nidos. Los pescadores deben emplear canoas a remo o palanca.-

Las letras (A) y (T) significan Acuática y Terrestre respectivamente, pero muchas especies catalogadas como terrestres frecuentan lugares pantanosos en ocasiones y muchas más viven en los árboles sobre los cuales se alimentan con frutos, insectos, hojas, etc.,. También para nidificar. La abreviatura Mig. significa que la especie es migratoria.-

## 2° MAMÍFEROS .-

La lista siguiente de los mamíferos de la región de la Laguna, es muy deficiente, pues este grupo no ha sido suficientemente estudiado en el Valle y carecemos de los datos sobre la existencia de muchas especies, particularmente en el grupo de los roedores que es muy numeroso y también en el de los quirópteros. Incluye algunas especies que existieron hasta hace relativamente poco tiempo en ese lugar y que podrían ser replantados, pero no incluye especies como la Danta y el Tigre también desaparecidos, pero cuya replantación sería imposible e inaconsejable.

### Orden: MARSUPIALIA

Familia : Didelphidae - Chuchas o Zarigüeyas, Faras, Marmosas, etc.

|                                                            |                      |     |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| <u>Didelphis</u> <sup>marmosotis</sup> <u>azarae</u> Sbsp. | Chucha Común         | T.  |
| <u>Marmosa</u> <u>cauca</u> Sbsp.                          | Chuchita de Platanar | (T. |
| <u>Philander</u> <u>laniger</u>                            | Chucha lanuda        | T.  |
| <u>Chironectes</u> <u>mínimus</u>                          | Chucha de Agua       | A.  |

### Orden : CHIROPTERA

Familia: Desmodontidae - Vampiros o Murciélagos mordedores.

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| <u>Desmodus</u> <u>r. rotundus</u> | Vampiro común           |
| <u>Diphylla</u> <u>ecaadata</u> ?  | Vampiro de doble escudo |

Familia : Phyllostomidae - Falsos vampiros, Murciélagos de Lanza.

|                                                  |                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| <u>Phyllostomus</u> <u>hastatus</u> <u>cauca</u> | Vampiro de Lanza, Moharra. |
| <u>Artibeus</u> <u>jamaicensis</u> sbsp.         | Vampiro listado.           |

Familia : Vespertilionidae - Murciélagos de Membrana peluda.

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <u>Dasypterus</u> <u>ega fuscatus</u> | Murciélago rojizo. |
|---------------------------------------|--------------------|

Familia : Molossidae - Murciélagos Cola de Ratón.

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| <u>Eumops</u> sp.                       | Murciélago Orejudo.            |
| <u>Molossus</u> <u>crassicaudatus</u> ? | Murciélago de cola ensanchada. |

### Orden : PRIMATES

Familia : Cebidae - Monos, Micos, Martejas.

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <u>Alouatta</u> <u>seniculus</u> | Mono Aullador Rojo (escaso) |
| <u>Aotus</u> <u>lemurinus</u>    | Mono Nocturno, Martėja "    |

Orden : LAGOMORPHA

Familia : Leporidae - Conejos, Liebres.

Sylvilagus brasiliensis sbsp. Conejo común.

Orden : RODENTIA

Familia : Sciuridae - Ardillas.

Sciurus hoffmanni sbsp. Ardilla común.

Familia : Muridae - Ratas y ratones.

*Oryzomys affaroi*  
" *Caliginosus*  
*albifrons* y *Rattus rattus*  
Ratón de campo  
Ratón gris

Existen varias especies de ratas y ratones acuáticos y terrestres, pero es necesario colectarlos allí para determinarlos exactamente.-

Familia : Hydrochoeridae - Capibaras, Lanchas.

Hydrochoerus hydrochoeris Lancha (Casi extinguida)

Familia : Dasyproctidae - Guatines, Agutíes.

Dasyprocta veriegata sbsp.

Guatín (escaso)

*Cuniculus* Agouti paca sbsp.

Guagua (casi extinguida)

Orden : CARNIVORA

Familia : Canidae - Perros, Zorros, etc.

Dusicyon thous sbsp. Zorro, Lobito.

Familia : Mustelidae - Comadrejas, Nutrias, Tairas.

Lutra, sp. Nutria (bastante escasa)

Mustela frenata sbsp.

*Galera* Eira barbara Taira, Ulamá.

Familia : Felidae - Tigres, Tigrillos, Gatos.

Felis pardalis Ocelote, Tigrillo Real.

Felis concolor sbsp. Puma (extinguido).

Felis onca Tigre, Yaguar "

Herpailurus jaguarundi Gato-Zorro. (casi extinguido)

Orden : ARTIODACTYLA

Familia : Tayassuidae - Sainos, Tatabros, etc.

Tayassu pecari Tatabro, Cafuche. (extinguido en la zona)

Familia : Cervidae - Venados.

Mazama colombiana sbsp. Venado bayo. Casi extinguido.

Algunas de las especies de mamíferos anotadas en esta lista como extinguidas, podrían replantarse, como el venado y los monos. Otros quizá no convendría replantarlos por lo pequeño del área, puesto que son nocivos a la agricultura, piscicultura y avicultura, o por ser predadores muy grandes como el jaguar y el puma.

Este estudio preliminar forma la primera parte del reconocimiento para determinar la fauna del Valle. Conviene hacer recolecciones metódicas en varios meses del año en la Laguna y sus alrededores, para determinar mejor el movimiento, abundancia y frecuencia de las poblaciones animales. Para la recolección de mamíferos, especialmente los roedores pequeños, es necesario instalar líneas de trampas especiales para capturarlos, y para los murciélagos es necesario emplear redes y escopeta por la noche. Esto requiere bastante tiempo, pues continuamente cambia la población durante el año y es indispensable hacer trabajo continuo. Para lograr este fin, se hace indispensable el establecimiento de una Estación Biológica allí, la cual sería de gran utilidad para el estudio de toda la fauna del Valle (meseta) y, además, desde allí se podría controlar y vigilar mejor el Santuario y servirá de alojamiento a los científicos nacionales y extranjeros que deseen adelantar estudios especiales allí.-

Este informe corresponde a los estudios de los meses comprendidos entre el 16 de Febrero y 15 de Marzo, y 16 de Marzo y 15 de Abril del año en curso.-

Estoy a sus órdenes para ampliar los detalles que sea necesario, así como para indicar lo que mejor convenga en relación con el mejoramiento del medio ambiente en la Laguna y la reintroducción de ciertas especies extinguidas que conviene replantar, como el Capibara o Lancha que se alimenta de vegetación acuática y contribuye a equilibrar este aspecto de la conservación del medio ambiente.-

También es muy importante establecer las épocas de nidificación y reproducción de la fauna en esa zona. Yo tengo algunos datos de estudios anteriores pero es necesario completarlos, para determinar así con exactitud las épocas de veda que deben regir la Caza en el resto de la meseta del Valle.-

De usted att. y SS.,

(fdo) F. CARLOS LEHMANN V.  
Coordinador de Recursos Naturales.-

copia fiel tomada del Arch. "Vida Silvestre" RR. Naturales, de la Secretaría de agricultura, 1960-1961.-  
anaj.-

Julio-1967.- *Copia*