

D705 *b*

BUTEO POECILOCHROUS o ad. Fase blanca.

Loc. Rio Molino.- Carretera a Puracé, Diciembre de 1936 Lehmann Col.
Iris, café oscuro.- cera verdosa.- patas amarillas.-pico, brown blue.

Cabeza, nuca, garganta, lados del pecho y manto, negro pizarra, en la ultima región salpicado de blanco herrumbroso. Partes inferiores, tibias y coberteras sub-caudales, blancas, ligeramente listado en los costados por líneas irregulares negruzcas, salpicado de herrumbroso. Axilares blancas, notablemente listadas de negruzco y rojizo herrumbroso. Primarias y secundarias de un fondo gris cenizo y listado con 9 o 10 líneas mas oscuras y una banda final más ancha del mismo color. Grandes coberteras supra-alaes semejantes en coloración a las secundarias. Las medianas casi negras o negro pizarra y las menores hasta el borde de ala en los hombros de color rojo ladrillo que se extiende a la mayor parte de las escapulares, donde están listadas transversalmente de negruzco mientras las plumas de los hombros tienen el centro (shafts) negro.

Rabadilla blanca listada transversalmente de herrumbroso. Coberteras supra-caudales completamente blancas. Cola por encima blanca un poco cenicienta en los lados externos de las plumas y listada transversalmente con 6-7 líneas irregulares de color pardo negruzco, con una ancha banda subterminal negra. Cola por debajo absolutamente blanca con una banda negra subterminal. Coberteras infra-alaes mayores blancas densamente listadas de café negruzco, las medianas de rojizo y las menores casi completamente blancas,

BUTEO POECILOCHROUS o ad. Fase negra.

Loc. Palo Verde- Patia, Cauca Alt. 900 Julio de 1936

Ala. 465-70; cola 210; tarso 91. Culmen 31
Pico Brun blue, Cera amarillo verdosa, patas amarillas, iris, castaño oscuro.-

Cabeza, espalda, garganta pecho y flancos, negro pizarra medio plumizo, tibias, castaño avellana tiznadas en el lado exterior de negruzco o pizarra. Escapulares, pizarra-negri, las menores salpicadas de castaño avellana.- Primarias y secundarias con fondo gris cenizo listadas transversalmente por siete-ocho líneas mas oscuras y una ancha banda terminal del mismo color.- Coberteras supra-alaes mayores más oscuras y listadas en la misma forma.- Coberteras menores castaño avellana formando el hombro.- Rabadilla bastante blanca pero notablemente salpicada de plumizo oscuro o pizarra y listadas de café negro.- Coberteras supracaudales más blancas que la rabadilla y salpicado y listado en la misma forma.- Cola por encima blancos los lados externos de las plumas ceniciento grisoso atravezada por 6-7 líneas irregulares, café negro y ancha banda subterminal negra.- Pecho, flancos y parte alta del abdomen notablemente salpicada o lavada de castaño avellana.- Parte final del abdomen y criso castaño avellana salpicado de plumizo negro.- Coberteras subcaudales blancas, listadas transversalmente con líneas irregulares café oscuro. Cola por debajo blanca con la banda subterminal negra.- Alas por debajo gris plateado notablemente listadas 8-9 líneas oscuras y una ancha banda terminal del mismo color.- Coberteras infra-alaes mayores, un poco mas oscuras.- medianas, pizarra listadas de blanco y menores, castaño avellana

+
BUTEO POLYOSOMA 0 AD/ Rase blanca.

Formúla alar

Formula alar. 3a / larga; 2a- 4a tres primeras recortadas.
 Ala 400; cola 220 Tarso 77 Culmen 25.
 Iris, castaño oscuro.- Cera amarilla.- patas amarillas.-pico Broun blue.
 Frente blanquecina estriada.- coronilla gris ceniza aplomado.- nuca superior igual a la coronilla.- lados de la cara, barbilla, garganta, lados del cuello y pecho, blanco puro.- Auriculares superiores cenicientas, inferiores blancas estriadas del mismo color.- lados del pecho, plumizos.-parte posterior de la nuca, manto y parte de las escapulares, rojo ladrillo intenso, algunas plumas con el centro y líneas astilares negras.- Escapulares mayores, cris ceniciento listadas transversalmente de pardo negruzco y ancha banda subterminal oscura.- Coberteras supra-alaes, gris ceniciento, listadas de plumizo o pizarra oscuro, con un ligero margen final blanquecino.- Secundarias de fondo, gris ceniza, listadas con 6-7 líneas plumizas oscuras y una ancha banda subterminal del mismo color, terminadas por un margen apical blanquecino.- Primaris igual que las secundarias pero sin margen blanco al rinal.- Rabadilla, gris cenizo o algo cenicienta.- Coberteras supracaudales superiores, blanco ceniciento notablemente pintadas de plumizo, las inferiores blancas con 2-3 líneas irregulares oscuras.-Cola por encima blanca con rastros de 6 líneas transversales irregulares y oscuras en la pluma central y salpicada en los lados externos de las plumas laterales de ceniciento atravesado por ancha banda subterminal negra de 45 Mm. que se desvanece hacia la punta que es blanquecina.- Partes inferiores blancas listadas por líneas irregulares, mas fuertes en los flancos, menos en el centro y casi nulas en la tibia.- Lado inferior de las alas, blanco plateado y ceniciento, coberteras infra-alaes blancas, listadas por pocas líneas irregulares de color negro parduzco.- Coberteras subcaudales y cola por debajo, blanco puro, la ultima con una ancha banda subterminal y margen final mas ancho por encima.

BUTEO POLYOSOMA o Ad. Faes clara.

Formúla alar:3 ; 2-4; 5-2; 3 primeras recortadas.
 Iris, castaño oscuro.- cera, amarillo verdoso.- patas amarillas.- Pico, brun blue.
 Ala 375.- Cola 201.- Tarso 85.- Culmen 24.

Cabeza y nuca, gris cenizo con el centro de las plumas negro.- parte inferior nuca y manto, gris ceniza uniforme; escapulares, ligeramente más oscuras y listadas transversalmente de plumizo.- hombros igual que el manto; coberteras supraalares igual a las escapulares; secundarias, gris ceniza, atravesadas por 6 líneas de color plumizo oscuro y ancha banda subterminal del mismo color terminada en punta blanca.- Primarias semejantes a secundarias pero más oscuras y sin punta blanca.- Rabadilla, gris ceniza.- cola por encima blanca con rastros de 5 líneas irregulares transversales en las plumas centrales y con ancha banda subterminal negra de 35 Mm. continuado por una sombra cenicienta y terminada en un borde blanco.- Coberteras supracaudales, blancas ligeramente listadas de plumizo.- Lados de la cara, barba, garganta, pecho, parte superior del abdomen y coberteras subcaudales, blanco puro.- lados del pecho cenicientos.- tibias y flancos, blancos, listados de negro parduzco más intensamente en los flancos.- abdomen blanco, ligeramente listado de plumizo.- lado inferior de las alas, blanco plateado y ceniciento.- coberteras infraalares blancas, listadas de negro parduzco, las menores más blancas.- Cola por debajo blanca, con banda subterminal negra y ancho margen rinal blanco.