

UNIVERSIDAD NACIONAL

INSTITUTO BOTANICO

CIUDAD UNIVERSITARIA

BOGOTA - COLOMBIA

APARTADO NACIONAL 2585

TELEFONO 3043

From Brehms Thierleben T. 6. p. 344

Brunnstein's

NUMERO

1926

The Die Thiere Brasiliens.

SERVICIO


T. II. p.

0706

Género *Morphnus*. - Cuv.

de 193

Morphnus guianensis Saud.



En las selvas del Brasil ^{alberga} ~~vive~~ además una rapaz típica; el águila estranguladora, o águila gavilán *Morphnus guianensis* Saud., la única especie del género *Morphnus* Cuv. Tiene el tamaño, la fuerza y la arrogancia del águila; pero la forma del Azor. Su longitud es de 70 cms. la envergadura 150-154 cms. el largo del ala plegada es de 40-42, la cola 30 cms. El cuerpo es grueso, la cabeza grande, el pico algo estirado, ~~no~~ bajo, pero relativamente débil; la mandíbula superior muy ganchuda, afilada y aguda, el borde poco recortado; los tarsos, por lo menos el doble de largos que el dedo central, y muy poco empuñados abajo del talón, el resto está cubierto por escamas que los rodean como una cinturón. La garra corta, pero no débil, está armada con uñas robustas, fuertes y agudas. Las alas son cortas. La cola es ancha y larga.

Morphnus.

0206 75

(1) cambia con la edad del ave, ^{plumaje} que a ^{se}

El plumaje es semejante al de los butros, muy flojo y suave. Las plumas se prolongan ~~en~~ en la parte posterior de la cabeza formando un espete o moño de 15 cms. de longitud ~~(que cambia con la edad)~~.

Segun el principe de Wied, tienen la cabeza, el cuello, el pecho, el abdomen, la rabadilla y las tibias blancas y sin manchas, y ^{algunos veces} escasamente ^{excitadas} ~~de~~ pintadas de amarillentos. La espalda, los hombros y parte superior de las alas gris-rojizo-mate, ^{porque cada pluma de esta parte está manchada} ~~debilmente~~ ^{fragmentos de esta color} rayadas transversalmente y marmoreadas. Las primarias son negro-café con ^{bandas anchas} ~~manchas~~ transversales gris-rojizas. Las plumas de la cola son semejantes en coloración.

A ^{ninguno indifereentemente a} ~~un~~ Pelzel ~~contradice~~ esta descripción, y dice que este plumaje es de los jóvenes y que los adultos son más oscuros. ^{Entonces} ~~también~~ la cabeza y la garganta son café oscuro, la ~~nuca~~, la espalda, la parte superior, las alas y ^{parte} ~~debajo~~ del cuello y pecho negro-verdosos. ^{peleteros supracaudales} ~~La cola por encima~~ con bandas irregulares blancas y la terminal ^{en} blanca.

El Principe de Wied, Schumacher y

Morphnus

Burmeister, nos cuentan algo sobre la ^{residencia} (costumbres) y género de vida de esta ave. Según ellos esta águila ^{churuguen} está distribuida sobre la mayor parte de Sur-América y ^{permanece} (vive) principalmente en ^{las} selvas cerca de las costas y también en los bosques de las sabanas, y ^{de preferencia} (sobre todo) a orillas de los ríos. Se le ve ~~que gusta~~ planear en círculos y es muy fácil de reconocer por su plumaje blanco-brillante por debajo que contrasta notablemente con el intenso azul del cielo.

Según Schomburgk, se distingue también ~~de la~~ ^{de la} ~~águila~~ por su fuerte grito. Elige para descansar ^{los ramos secos del} las ~~más~~ ^{más altas} ramas de los árboles ~~secos~~, donde permanece sin moverse horas enteras; únicamente levanta de tiempo en tiempo su magnífica ^{copete} ~~copete~~. Sus presas son mamíferos y pájaros (aves). El Principe de Wied ^{encontró} ~~en~~ ^{el} su estómago ~~un~~ ^{los restos de} ~~opossum~~. ^{de informar los cazadores que esta} ~~los nativos dicen que se~~ ^{examinado por el} ~~alimento~~ ^{ave persigue especialmente a los} ~~de monos~~. Según Schomburgk, caza en nido en árboles no muy altos. ^{La caza de esta águila presenta dificultades} ~~Es bastante difícil de cazar~~ ^{porque vive} ~~y casi no la logran sino los indios di rífla y~~ ^{en árboles muy altos y solamente puede} ~~tirarse con rifle y los indios.~~ ^{los indios}